2.13 Flächenparametrisierung

DEFINITION

Seien $U \subseteq \mathbb{R}^2$, $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$. Dann parametrisiert f die **Fläche** $f(U)$.

BEISPIEL (Parametrisierung des Torus)

Wir parametrisieren den **Torus** $T = T(R, r) \subseteq \mathbb{R}^3$ mit „Radius“ R und „Dicke“ $2r$.

Wir betrachten dazu zu jedem Punkt $R(\cos(u), \sin(u), 0)$ eines in der x_1 - x_2 -Ebene verlaufenden Kreises mit Radius R einen in der durch $a := (\cos(u), \sin(u), 0)$ und $b := (0, 0, 1)$ aufgespannten Ebene verlaufenden Kreis mit Radius r .

Dann parametrisiert $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ mit

$$\begin{aligned} f(u, v) &= (R \cos(u), R \sin(u), 0) + r \cos(v)a + r \sin(v)b \\ &= (R \cos(u) + r \cos(v) \cos(u), R \sin(u) + r \cos(v) \sin(u), r \sin(v)) \end{aligned}$$

den Torus T .

Zu $x = (u, v)$ untersuchen wir die Bedeutung der beiden Richtungsableitungen $D_{e_1}f(x) = \partial_1 f(x)$ und $D_{e_2}f(x) = \partial_2 f(x)$.

$$D_{e_1}f(x) = \frac{d}{dt}f(u + t, v)|_{t=0} = \frac{d}{dt}f(t, v)|_{t=u}$$

beschreibt den Tangentialvektor an der Kurve $t \mapsto f(t, v)$ im Punkt $t = u$ („Koordinatenkurve“).

Analog ist

$$D_{e_2}f(x) = \frac{d}{dt}f(u, v + t)|_{t=0} = \frac{d}{dt}f(u, t)|_{t=v}$$

der Tangentialvektor an der Kurve $t \mapsto f(u, t)$ im Punkt $t = v$.

Da $\partial_1 f(x)$, $\partial_2 f(x)$ zwei linear unabhängige Tangentialvektoren am Torus T im Punkt $f(x)$ sind, bilden sie die lineare Hülle (den Span) der Tangentialebene in $f(x)$.

Entsprechende Betrachtung können wir für allgemeines $\xi \in \partial B_1(0)$ durchführen:

Dann ist $D_\xi f(x)$ der Tangentialvektor am Bild $t \mapsto f(x + t\xi)$ der Geraden $t \mapsto x + t\xi$.

Beachte: Das Bild dieser Geraden beschreibt eine Kurve auf der Oberfläche des Torus.

Ist dabei ξ_i klein, dann ändert sich die i -Komponente langsam; ist ξ_i groß, so ändert sie sich schnell.

BEMERKUNG

Die Torusparametrisierung $\Phi : [0, 2\pi)^2 \rightarrow \Phi([0, 2\pi)^2)$ mit

$$\Phi(u, v) := \begin{pmatrix} R \cos(u) + r \cos(v) \cos(u) \\ R \sin(u) + r \cos(v) \sin(u) \\ r \sin(v) \end{pmatrix}$$

ist stetig differenzierbar und lokal injektiv mit

$$\mathfrak{J}_\Phi(u, v) = \begin{pmatrix} -R \sin u - r \cos v \sin u & -r \sin v \cos u \\ R \cos u + r \cos v \cos u & -r \sin v \sin u \\ 0 & r \cos v \end{pmatrix}.$$

Man rechnet dabei leicht nach, dass $\mathfrak{J}_\Phi(u, v)$ für alle $u, v \in \mathbb{R}$ vollen Rang hat.

Der Torus lässt sich aber auch als Vereinigung der Graphen zweier Funktionen $\Psi_1, \Psi_2 : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ darstellen:

$$\begin{aligned} \Psi_1(x, y) &:= +\sqrt{r - \left(\sqrt{x^2 + y^2} - R\right)^2}; \\ \Psi_2(x, y) &:= -\sqrt{r - \left(\sqrt{x^2 + y^2} - R\right)^2}. \end{aligned}$$

Wir setzen dabei $D := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \sqrt{x^2 + y^2} - R)^2 \leq r\}$.

In Mengenschreibweise:

$$T = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (\sqrt{x^2 + y^2} - R)^2 + z^2 = r\}$$

Als Letztes wollen wir noch einige verwandte Parametrisierungen von Φ ableiten:

$$\Phi_1(u, v) := \begin{pmatrix} R \cos(u) + R(ur) \cos(v) \cos(u) \\ R \sin(u) + R(ur) \cos(v) \\ (ur) \sin(v) \end{pmatrix}$$

$$\Phi_2(u, v) := \begin{pmatrix} R \cos(u) + R\left(\frac{r}{\sqrt{u}}\right) \cos(v) \cos(u) \\ R \sin(u) + R\left(\frac{r}{\sqrt{u}}\right) \cos(v) \\ \frac{r}{\sqrt{u}} \sin(v) \end{pmatrix}$$

$$\Phi_3(u, v) := \begin{pmatrix} \frac{u}{4} R \cos(u) + Rr \cos(v) \cos(u) \\ \frac{u}{4} R \sin(u) + Rr \cos(v) \\ r \sin(v) \end{pmatrix}$$

$$\Phi_4(u, v) := \begin{pmatrix} \frac{R}{\sqrt{u}} \cos(u) + Rr \cos(v) \cos(u) \\ \frac{R}{\sqrt{u}} \sin(u) + Rr \cos(v) \\ r \sin(v) \end{pmatrix}$$

$$\Phi_5(u, v) := \begin{pmatrix} R \cos(u) + Rr \cos(v) \cos(u) \\ R \sin(u) + Rr \cos(v) \\ r \sin(v) + \frac{1}{2}u \end{pmatrix}$$

$$\Phi_6 := \begin{pmatrix} R \sin(u) + Rr \cos(v) \\ r \sin(v) + \frac{1}{2}u \\ R \cos(u) + Rr \cos(v) \cos(u) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \Phi_5(u, v)$$

BEISPIELE (Standardparametrisierungen im $\mathbb{R}^3$)**Kugel** mit Radius R

$$\Phi(u, v) = \begin{pmatrix} R(\sin(u) \cos(v)) \\ R \sin(u) \sin(v) \\ R \cos(u) \end{pmatrix}$$

Ellipsoid mit Parametern $a, b, c \in \mathbb{R}^+$

$$\Phi(u, v) = \begin{pmatrix} a \sin(u) \cos(v) \\ b \sin(u) \sin(v) \\ c \cos(u) \end{pmatrix}$$

Wendelfläche der Höhe $2\pi h$

$$\Phi(u, v) = \begin{pmatrix} u \cos(v) \\ u \sin(v) \\ hv \end{pmatrix}$$

Möbiusband

$$\Phi(u, v) = \begin{pmatrix} \cos(u) + v \sin(\frac{u}{2}) \cos(u) \\ \sin(u) + v \sin(\frac{u}{2}) \sin(u) \\ v \cos(\frac{u}{2}) \end{pmatrix}$$

Elliptisches Paraboloid mit Parametern $a, b \in \mathbb{R}^+$

$$\Phi(u, v) = \begin{pmatrix} au \cos(v) \\ bu \sin(v) \\ u^2 \end{pmatrix}$$

Hyperboloid mit Parametern $a, b, c \in \mathbb{R}^+$

$$\Phi(u, v) = \begin{pmatrix} a \cosh(u) \cos(v) \\ b \cosh(u) \sin(v) \\ c \sinh(u) \end{pmatrix}$$