Ausgabe: Donnerstag, 01.05.2014

Abgabe: Donnerstag, 08.05.2014, 10:00 Uhr, in den Briefkästen auf F4

Analysis II

2. Übungsblatt

□ **Aufgabe 5** (natürliche Matrixnormen) (6 Punkte)

1. Sei $\|\cdot\|$ eine Norm auf $\mathbb{R}^n$. Zeigen Sie, dass $\|A\| = \sup \left\{ \frac{\|Ax\|}{\|x\|} \mid x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \right\}$ eine Norm auf $\mathbb{R}^{n \times n}$ definiert.
2. Zeigen Sie, dass für diese Matrixnorm gelten $\|Ax\| \leq \|A\| \|x\|$ für alle $x \in \mathbb{R}^n$ sowie $\|AB\| \leq \|A\| \|B\|$.
3. Zeigen Sie, dass $\|A\|_1 = \max_{i=1, \dots, n} \sum_{k=1}^n |a_{ki}|$ und $\|A\|_\infty = \max_{k=1, \dots, n} \sum_{i=1}^n |a_{ki}|$.

Bemerkung: $\|A\|_1$ wird aus nahe liegenden Gründen als *Spaltensummennorm*, $\|A\|_\infty$ als *Zeilensummennorm* von A bezeichnet.

4. Zeigen Sie, dass $\|A\|_2^2 \leq \|A\|_F^2 = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n |a_{ik}|^2$ erfüllt ist, dass aber im Allgemeinen keine Gleichheit gilt.

Bemerkung: Die zur euklidischen Norm $\|\cdot\|_2$ gehörige Matrixnorm ist die *Spektralnorm*, d.h. $\|A\|_2$ ist die Wurzel des kleinsten Eigenwerts der symmetrischen Matrix $A^T A$. $\|\cdot\|_F$ definiert offenbar auch eine Norm auf $\mathbb{R}^{n \times n}$, die sogenannte *Frobeniusnorm*.

□ **Aufgabe 6** (Konvergenz in metrischen Räumen) (6 Punkte)

Auf dem Raum X aller reellen Zahlenfolgen definieren wir eine Abbildung $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ via

$$d(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \frac{|x_n - y_n|}{1 + |x_n - y_n|}.$$

1. Zeigen Sie, dass d wohldefiniert ist, d.h. dass die Reihe stets konvergiert.
2. Zeigen Sie, dass d die Axiome einer Metrik erfüllt und (X, d) somit ein metrischer Raum ist.
3. Seien $\xi_k = (x_{kn})_{n \in \mathbb{N}} \in X$ und $\bar{\xi} = (\bar{x}_n)_{n \in \mathbb{N}} \in X$. Zeigen Sie, dass die Folge $(\xi_k)_{k \in \mathbb{N}} \subseteq X$ genau dann für $k \rightarrow \infty$ bzgl. d gegen $\bar{\xi} \in X$ konvergiert, wenn alle Komponentenfolgen $(x_{kn})_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ für $k \rightarrow \infty$ bzgl. $|\cdot|$ gegen $\bar{x}_n \in \mathbb{R}$ konvergieren.

□ **Aufgabe 7** (Stetigkeit in metrischen Räumen) (3 Punkte)

Seien (X, d) ein metrischer Raum und $x_0 \in X$. Überprüfen Sie die Abbildung $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) = d(x_0, x)$ auf Stetigkeit, gleichmäßige Stetigkeit und Lipschitz-Stetigkeit.

□ **Aufgabe 8** (Zusammenhang und Kompaktheit in normierten Räumen) (5 Punkte)

1. Sei $(X, \|\cdot\|)$ ein normierter Raum. Zeigen Sie, dass alle Kugeln $K(x, r) = \{y \in X \mid \|x - y\| \leq r\} \subseteq X$ konvex und damit insbesondere wegzusammenhängend sind.
2. Zeigen Sie, dass wegzusammenhängende Mengen in X speziell zusammenhängend sind.
3. Seien $X = \mathbb{R}^n$ und $O \subseteq X$ offen und zusammenhängend. Zeigen Sie, dass O wegzusammenhängend ist. (★★)
4. Zeigen Sie, dass Kugeln $K(x, r)$ im $\mathbb{R}^n$ stets kompakt sind. (★★)

Bemerkung: Es gilt sogar: Die Einheitskugel (und damit alle Kugeln) eines normierten Raumes ist *genau dann* kompakt, wenn der Raum endlichdimensional ist.