Zusatzblatt 2

AUFGABE 11Finden Sie Lösungen $x_1, x_2, x_3, x_4 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ zu dem linearen Anfangswertproblem

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = 2x_1 + x_2 + x_3 & x_1(0) = c_1 \\ \dot{x}_2 = 2x_2 + x_3 + 3x_4 & x_2(0) = c_2 \\ \dot{x}_3 = 2x_3 & x_3(0) = c_3 \\ \dot{x}_4 = x_4 & x_4(0) = c_4 \end{cases},$$

wobei c_1, c_2, c_3, c_4 reelle Konstanten sind.**LÖSUNG**

(1) Reduktion auf System erster Ordnung:

$$\dot{x} = Ax \text{ mit } A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}, x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^4.$$

(2) Bestimmung der Eigenwerte: $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2$.

(3) Berechnung der zugehörigen Eigenvektoren:

$$\begin{aligned} (A - \lambda_1)v_1 = 0 &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} y_1 = 3c \\ y_2 = -3c \\ y_3 = 0 \\ y_4 = c \end{cases} \rightsquigarrow v_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}; \\ (A - \lambda_2)v_2 = 0 &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} y_1 = c \\ y_2 = 0 \\ y_3 = 0 \\ y_4 = 0 \end{cases} \rightsquigarrow v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

(4) $v_2 \in \text{Bild}(A - \lambda_2)$, denn $(A - \lambda_2)e^{(2)} = v_2$. Berechnung der beiden Hauptvektoren zu v_2 :

$$\begin{aligned} (A - \lambda_2)h_1 = v_1 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} y_1 = c \\ y_2 = 1 \\ y_3 = 0 \\ y_4 = 0 \end{cases} \rightsquigarrow h_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}; \\ (A - \lambda_2)h_2 = h_1 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} y_1 = c \\ y_2 = 0 \\ y_3 = 1 \\ y_4 = 0 \end{cases} \rightsquigarrow h_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

(5) Spätestens jetzt (in diesem Beispiel aber schon nach (3)) ist klar, wie die JORDAN-Matrix aussieht:

$$J = \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right).$$

(6) Transformationsmatrix (man beachte die richtige Reihenfolge der Spalten):

$$U = (v_2 \ h_1 \ h_2 \ v_1) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightsquigarrow U^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(7) Berechnung von $\exp(tJ)$:

$$e^{tJ} = \left(\begin{array}{ccc|c} e^{2t} & te^{2t} & \frac{t^2}{2}e^{2t} & 0 \\ 0 & e^{2t} & te^{2t} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & e^{2t} \\ \hline 0 & 0 & 0 & e^t \end{array} \right).$$

(8) Fundamentalsystem:

$$e^{tA} = Ue^{tJ}U^{-1} = \left(\begin{array}{cccc} e^{2t} & te^{2t} & (\frac{t^2}{2} + t)e^{2t} & 3(te^{2t} + e^t) \\ 0 & e^{2t} & te^{2t} & 3(e^{2t} - e^t) \\ 0 & 0 & e^{2t} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & e^t \end{array} \right).$$

(9) Lösung des Anfangswertproblems:

$$x(t) = e^{tA}x_0 = \left(\begin{array}{c} c_1e^{2t} + c_2te^{2t} + c_3(\frac{t^2}{2} + t)e^{2t} + c_43(te^{2t} + e^t) \\ c_2e^{2t} + c_3te^{2t} + c_43(e^{2t} - e^t) \\ c_3e^{2t} \\ c_4e^t \end{array} \right).$$

AUFGABE 12

Eine Kugel wird im Punkt $x_0 = x(0)$ einmalig angestoßen und rollt mit Anfangsgeschwindigkeit $v_0 = \dot{x}(0)$ von dort aus ohne weiteren Antrieb, aber unter dem Einfluss der Reibungskraft

$$f(v) = \alpha + \beta v^2 \quad (\alpha, \beta > 0)$$

geradlinig weiter.

Die Bewegung der Kugel wird dabei beschrieben durch die Differenzialgleichung

$$m\ddot{x} = -f(\dot{x}).$$

(1) Wie lange dauert es, bis die Kugel stehen bleibt? Wie lange dauert es maximal ($v_0 \rightarrow \infty$)?

(2) Welchen Weg hat sie dann zurück gelegt?

LÖSUNG

Ohne Reibung liegt ein triviales lineares Anfangswertproblem vor:

$$\begin{cases} \ddot{x}(t) = 0 \\ x(0) = x_0 \\ \dot{x}(0) = v_0 \end{cases} \rightsquigarrow x(t) = tv_0 + x_0.$$

Mit Reibungsterm: Substituiere $u := \dot{x}$ und löse

$$\begin{cases} \dot{u} = -\frac{1}{m}(\alpha + \beta u^2) \\ u(0) = v_0 \end{cases}.$$

Mit Separation der Variablen:

$$f(t) := 1 \text{ und } g(u) := -\frac{1}{m}(\alpha + \beta u^2) \rightsquigarrow F(t) := \int_0^t dt = t \text{ und } G(u) := -m \int_{v_0}^u \frac{dy}{\alpha + \beta y^2}.$$

Unter Ausnutzung von

$$\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan(x)$$

ergibt Gleichsetzen

$$\begin{aligned}
 G(u) &= -m \int_{v_0}^u \frac{dy}{\alpha + \beta y^2} \\
 &= -\frac{m}{\alpha} \int_{v_0}^u \frac{dy}{1 + \left(\sqrt{\frac{\beta}{\alpha}} y\right)^2} \\
 &= -\frac{m}{\alpha} \sqrt{\frac{\alpha}{\beta}} \left[\arctan \left(\sqrt{\frac{\beta}{\alpha}} y \right) \right]_{v_0}^u \\
 &= -\frac{m}{\sqrt{\alpha\beta}} \left(\arctan \left(\sqrt{\frac{\beta}{\alpha}} u \right) - \arctan \left(\sqrt{\frac{\beta}{\alpha}} v_0 \right) \right) \\
 &\stackrel{!}{=} t.
 \end{aligned}$$

Auflösen nach u ergibt

$$u = \sqrt{\frac{\alpha}{\beta}} \tan \left(\arctan \left(\sqrt{\frac{\beta}{\alpha}} v_0 \right) - \frac{\sqrt{\alpha\beta}}{m} t \right) = \dot{x}(t).$$

(1) Stillstand zur Zeit T bedeutet: $\dot{x}(T) = 0$. Mit $G(0) = F(T)$:

$$0 = \frac{m}{\sqrt{\alpha\beta}} \arctan(0) = -T + \frac{m}{\sqrt{\alpha\beta}} \arctan \left(\sqrt{\frac{\beta}{\alpha}} v_0 \right) \rightsquigarrow T = \frac{m}{\sqrt{\alpha\beta}} \arctan \left(\sqrt{\frac{\beta}{\alpha}} v_0 \right).$$

Für $v_0 \rightarrow \infty$:

$$\lim_{v_0 \rightarrow \infty} T(v_0) = \frac{m}{\sqrt{\alpha\beta}} \frac{\pi}{2} < \infty.$$

(2) Berechnung von $x(T)$ mit

$$\int \tan(x) dx = -\ln |\cos(x)| \quad (\text{auf geeignetem Bereich}) :$$

$$\begin{aligned}
 x(t) &= x_0 + \int_0^t \underbrace{\sqrt{\frac{\alpha}{\beta}} \tan \left(\underbrace{\arctan \left(\sqrt{\frac{\beta}{\alpha}} v_0 \right)}_{=:c_1} - \underbrace{\frac{\sqrt{\alpha\beta}}{m} s}_{=:c_2} \right)}_{=:c_1} ds \\
 &= x_0 + \sqrt{\frac{\alpha}{\beta}} \int_0^1 \tan(c_1 - c_2 s) ds \\
 x \in [0, \frac{\pi}{2}) &\stackrel{!}{=} x_0 + \sqrt{\frac{\alpha}{\beta}} \left(-\frac{1}{c_2} \right) [-\ln |\cos(c_1 - c_2 s)|]_0^t \\
 &= x_0 - \frac{m}{\beta} (\ln(\cos(c_1)) - \ln(\cos(c_1 - c_2 t))) \\
 t &\stackrel{!}{=} T \quad x_0 - \frac{m}{\beta} \ln \left(\cos \left(\arctan \left(\sqrt{\frac{\beta}{\alpha}} v_0 \right) \right) \right).
 \end{aligned}$$