Ausgabe: Freitag, 22.11.2013

Abgabe: Donnerstag, 28.11.2013, 10:00 Uhr, in den Briefkästen auf F4

Analysis I

5. Übungsblatt

□ **Aufgabe 17** (Grenzwerte von Folgen) (4 Punkte)

Verifizieren Sie die Grenzwerte folgender Folgen:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)^n = 1, \quad \forall x \in \mathbb{R} : \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{n!} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1.$$

□ **Aufgabe 18** (Konvergenzgeschwindigkeit) (5 Punkte)

Um ein Maß dafür zu erhalten, wie schnell eine Folge konvergiert, führen wir auf der Menge der reellen Zahlenfolgen die folgende Relation ein:

$$(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \sim (b_n)_{n \in \mathbb{N}} \quad :\Leftrightarrow \quad \exists k, K > 0 : \exists N \in \mathbb{N} : \forall n \in \mathbb{N}, n > N : k |a_n| \leq |b_n| \leq K |a_n|.$$

Wir sagen, eine Nullfolge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ *konvergiert mit Rate* $\alpha > 0$, wenn $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \sim (n^{-\alpha})_{n \in \mathbb{N}}$, und nennen α dann die *Konvergenzordnung* von $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

1. Zeigen Sie, dass $\sim$ eine Äquivalenzrelation ist.
2. Zeigen Sie, dass die Konvergenzordnung einer Nullfolge eindeutig bestimmt ist.
3. Zeigen Sie, dass die folgenden Zahlenfolgen Nullfolgen sind, und bestimmen Sie ihre Konvergenzordnungen:

$$a_n = \frac{n}{n^3 + n^2 + 1}, \quad b_n = \frac{1 + \sqrt{n}}{n^3}, \quad c_n = \frac{\sqrt[5]{n^4}}{n + 4}, \quad d_n = \frac{3}{\sqrt{2n^2 - 1}}, \quad e_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}.$$

□ **Aufgabe 19** (Die Eulersche Zahl e) (8 Punkte)

1. Zeigen Sie, dass die folgenden beiden Zahlenfolgen $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Intervallschachtelung bilden:

$$a_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}, \quad b_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} + \frac{1}{n!n},$$

Der Grenzwert $\lim a_n = \lim b_n$ wird mit e bezeichnet und *Eulersche Zahl* genannt.

2. Zeigen Sie, dass die Folge $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$, gegeben durch $c_n = (1 + \frac{1}{n})^n$, ebenfalls gegen e konvergiert.

Hinweis: Zeigen Sie, dass $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$ monoton wachsend ist und $c_n \leq a_n$ gilt, die Folge also speziell beschränkt durch e ist und damit konvergiert. Weisen Sie anschließend nach, dass $\lim c_n \geq a_n$ für alle $n \in \mathbb{N}$ erfüllt ist.

□ **Aufgabe 20** (Anwendung der Grenzwertsätze) (3 Punkte)

Gegeben sei die Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit $a_n = \frac{1}{n^2} + \dots + \frac{n}{n^2}$. Überprüfen Sie die folgende Argumentation auf Stichhaltigkeit und das Ergebnis auf Korrektheit:

Induktives Anwenden des ersten Grenzwertsatzes ergibt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \dots + \frac{n}{n^2} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} + \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{n^2} + \dots + \frac{n}{n^2} \right) = \dots = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n^2} + \dots + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n^2} = 0.$$

Insbesondere existieren die Grenzwerte der einzelnen Summandenfolgen $(\frac{N}{n^2})_{n \in \mathbb{N}}$ für $N = 1, 2, \dots$ und somit ist $\lim a_n = 0$.