Lineare Algebra

Übungsblatt 4

Aufgabe 4.1

- (a) Wir betrachten $V = \mathbb{R}^4$ in üblicher Weise als $\mathbb{R}$ -Vektorraum. Welche der folgenden Teilmengen von V sind *linear unabhängig*?

$$(i) \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$(ii) \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

- (b) Es sei W der $\mathbb{R}$ -Vektorraum der Funktionen von $\mathbb{R}$ nach $\mathbb{R}$. Welche der folgenden Teilmengen von W sind *linear unabhängig*?

$$(i) \{(\cos(x))^2, 1, (\sin(x))^2\}$$

$$(ii) \{\sin(x), \cos(x), x^2\}$$

$$(iii) \{f_r \mid r \in \mathbb{R}\} \text{ mit } f_r(x) := \begin{cases} 0, & \text{wenn } x < r; \\ 1, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Hier ist natürlich etwa $(\cos(x))^2$ eine laxe Notierungsweise für die *Funktion* aus W , die jedem $x \in \mathbb{R}$ gerade diesen Wert zuordnet

- (c) Es seien X und Y linear unabhängige Teilmengen eines Vektorraumes V . Keines der Elemente von X sei eine Linearkombination von Elementen aus Y und keines der Elemente von Y sei eine Linearkombination von Elementen aus X . Zeige oder widerlege (durch ein Gegenbeispiel): Die Menge $X \cup Y$ ist *linear unabhängig*.

Aufgabe 4.2

Es sei V ein Vektorraum der Dimension $n \in \mathbb{N}$ und $U \subset V$ ein Unterraum.

- (a) Zeige: Es gibt einen Unterraum $U' \subset V$ mit $U \cap U' = \{0\}$ derart, dass $V = U + U'$. Man nennt U' ein *Komplement* von U .

- (b) Es sei $U \neq U_1 \subset V$ ein weiterer Unterraum von V mit $\dim(U_1) = \dim(U)$. Zeige: Es gibt einen Unterraum U' derart, dass $U \cap U' = U_1 \cap U' = \{0\}$ und $U + U' = U_1 + U' = V$.

Aufgabe 4.3

Es seien $n \in \mathbb{N}$ und V der $\mathbb{R}$ -Vektorraum der Funktionen von $\mathbb{R}$ nach $\mathbb{R}$. Darin sei $P_n \subset V$ die Menge der *polynomialen Funktionen* von Grad $\leq n$, also

$$P_n = \{f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \alpha_n \cdot x^n + \dots + \alpha_0 \text{ f\"ur gegebene } \alpha_0, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R} \text{ (und alle } x \in \mathbb{R})\}$$

(a) Zeige, dass P_n ein *Untervektorraum* von V ist.

(b) Zeige, dass f\"ur jedes $r \in \mathbb{R}$ die Menge

$$U_n^r = \{f \in P_n \mid f(r) = 0\}$$

ein *Untervektorraum* von P_n ist.

(c) Gib f\"ur U_n^0 , U_n^1 , $U_n^0 + U_n^1$ und $U_n^0 \cap U_n^1$ jeweils eine *Basis* und die *Dimension* an.

Aufgabe 4.4

Welche der folgenden Abbildungen sind linear?

(a) $F: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$, definiert durch $F(x, y, z) := (x, y)$.

(b) $F: V \longrightarrow V$, definiert durch $F(x) := -x$, wobei K ein K\"orper und V ein K -Vektorraum sind.

(c) $F: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$, definiert durch $F(x, y, z) := (x, y, z) + (0, 1, 0)$.

(d) $F: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$, definiert durch $F(x, y) := (2x + y, y)$.

(e) $F: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$, definiert durch $F(x, y) := (y, x)$.

(f) $F: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$, definiert durch $F(x, y) := xy$.