
Reelle algebraische Geometrie I – Übungsblatt 4

Aufgabe 1 (8P).

- (a) Sei R ein reell abgeschlossener Körper und K ein Teilkörper von R , der relativ algebraisch abgeschlossen in R ist. Zeige, dass K auch reell abgeschlossen ist.
- (b) Zeige, dass es einen reell abgeschlossenen Körper gibt, der abzählbar ist.
- (c) Zeige, dass $K = \{a \in \mathbb{R} \mid \exists m \in \mathbb{N}_0 : b_1, \dots, b_m \in \mathbb{R} : 2 = [\mathbb{Q}(b_1) : \mathbb{Q}] = [\mathbb{Q}(b_2, b_1) : \mathbb{Q}(b_1)] = \dots = [\mathbb{Q}(a, b_m, \dots, b_1) : \mathbb{Q}(b_m, \dots, b_1)]\}$ ein Körper ist, welcher nicht reell abgeschlossen ist aber für den K^2 eine Anordnung ist.
- (d) Ist der Körper von Blatt 3 Aufgabe 3 (c) reell abgeschlossen?
- (e) Sei K ein angeordneter archimedischer Körper und a im algebraischen Abschluss von K . Zeige, dass jede Anordnung auf $K(a)$ ebenfalls archimedisch ist.

Aufgabe 2 (8P). Sei $f \in \mathbb{Q}[t]$ ein normiertes Polynom vom Grad 3. Schreibe

$$f = (t - a_1)(t - a_2)(t - a_3)$$

mit $a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{C}$.

- (a) Setze $d := (a_1 - a_2)(a_2 - a_3)(a_1 - a_3) \in \mathbb{C}$. Zeige, dass der Zerfällungskörper $\mathbb{Q}(a_1, a_2, a_3)$ von f genau dann reell ist, wenn $d^2 \geq 0$, indem du den folgenden Hinweis benutzt.
Hinweis: Zeige zuerst $d^2 \in \mathbb{Q}$ mit Galois-Theorie. Untersuche dann die Galoisgruppe von $\mathbb{Q}(a_1, a_2, a_3) | \mathbb{Q}$ mit einer Fallunterscheidung. Betrachte für diese Fallunterscheidung die Körpererweiterungen $\mathbb{Q}(d) | \mathbb{Q}$ und $\mathbb{Q}(a_1, a_2, a_3) | \mathbb{Q}$.
- (b) Zeige, dass $\mathbb{Q}(a_1, a_2, a_3)$ genau dann reell ist, wenn $a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R}$.
- (c) Zeige, dass ein $\lambda \in \mathbb{R}$ gibt so, dass $g := (f(t + \lambda)) = t^3 + yt + z$ mit $y, z \in \mathbb{R}$.
- (d) Zeige mit der Hermite-Methode, dass $\mathbb{Q}(a_1, a_2, a_3)$ genau dann reell ist wenn $-4y^3 - 27z^2 \geq 0$.
- (e) Zeige $-4y^3 - 27z^2 = (a_1 - a_2)^2(a_1 - a_3)^2(a_2 - a_3)^2$ durch Nachrechnen oder indem du ein Singularcode beschreibst, welcher selbiges verifizieren kann (diese Art von Gleichheit gilt sogar, wenn $f \in \overline{\mathbb{Q}}$ komplexe Koeffizienten hat, wobei man dann λ, y, z auch in $\overline{\mathbb{Q}}$ wählen muss)

Abgabe bis 24. November, 2017, 11:45 im Briefkasten RAG I in der Nähe von Raum F411.