

## 20. Script zur Vorlesung: Algebra (B III)

Prof. Dr. Salma Kuhlmann, Dr. Lorna Gregory, Katharina Dupont

WS 2012/2013: 17. Januar 2013

Wir werden später zeigen, dass  $S_n$  nicht auflösbar ist für  $n \geq 5$  (Galois).

### Bemerkung

Jede abelsche Gruppe ist trivialerweise auflösbar. Betrachte  $G \triangleright \{1\}$ .

Wir wollen nun auflösbare Gruppen charakterisieren.

### Definition 1

(a) Für  $g, h \in G$  definiere  $(g, h) := g^{-1}h^{-1}gh \in G$ .  $(g, h)$  heißt *Kommutator* von  $g$  und  $h$ .

#### Bemerkung 1

(i)  $gh = hg(g, h)$

(ii)  $(G, G)$  ist die *Kommutatorgruppe* von  $G$  und ist die Untergruppe, die durch  $S := \{(g, h); g, h \in G\}$  erzeugt wird.

#### Bemerkung 2

(i)  $(g, h) = (h, g)^{-1}$ , also ist  $\langle S \rangle = \{S_1 \cdots S_n \mid n \in \mathbb{N}; S_i \text{ ist ein Kommutator in } G\}$ .

(ii)  $G$  ist abelsch genau dann, wenn  $(G, G) = \{1\}$ .

**Notation:**  $(G, G) := G'$ .

(b) Wir definieren die iterierte Kommutatoren folgendermaßen:  $G'' := (G')'$ .

Per Induktion über  $k \in \mathbb{N}$ :  $G^{(k)} := (G^{(k-1)})'$ .

Wir werden nun die iterierte Kommutatoren ausnutzen, um unsere Charakterisierung zu geben.

### Proposition 1

Seien  $G, \bar{G}$  Gruppen und  $\eta : G \rightarrow \bar{G}$  ein Homomorphismus. Es gelten

1.  $\eta(g, h) = (\eta(g), \eta(h))$

2.  $\eta(G') \subseteq \bar{G}'$

3. Wenn  $\eta$  surjektiv ist, gilt ferner:  $\eta(G') = \bar{G}'$

4. Insbesondere für einen beliebigen Homomorphismus  $\eta$  gilt:  $\eta(G') = \eta(G)'$

**Zusatz:** 5. Allgemeiner gilt  $\eta(G^{(k)}) = \eta(G)^{(k)}$  für alle  $k \in \mathbb{N}$

**Beweis 1**

1.  $\eta(g, h) = \eta(g^{-1}h^{-1}gh) = \eta(g)^{-1}\eta(h)^{-1}\eta(g)\eta(h) = (\eta(g), \eta(h))$ .
2. Also aus 1. folgt unmittelbar  $\eta(G') \subseteq \overline{G'}$ .
3. Wenn  $\eta$  surjektiv ist, folgt aus 1. dass jeder Kommutator in  $\overline{G}$  liegt in  $\eta(G')$ . Es folgt also aus Bemerkung 2, dass  $\eta(G') \supseteq \overline{G'}$  und damit ist die Gleichheit bewiesen.
4. Klar, da  $\eta : G \rightarrow \eta(G)$  surjektiv ist.
5.  $\eta(G') = \eta(G)'$  ist 4.

Nun betrachte  $\eta : G' \rightarrow \overline{G}$  und 4. nochmal angewendet ergibt:

$$\eta((G')') = \eta(G')'$$

$$\text{i.e. } \eta(G'') = (\eta(G'))' = \eta(G)''$$

usw. per Induktion fortsetzen. □

**Proposition 2**

$K \triangleleft G \Rightarrow K' \triangleleft G$  (insbesondere:  $G' \triangleleft G$ ).

**Beweis**

Sei  $a \in G$  fest und betrachte  $\eta_a : K \rightarrow K$  wohldefiniert (weil  $K$  ein Normalteiler) und ein Homomorphismus  $k \mapsto aka^{-1}$ .

Aus Proposition 1 folgt:  $\eta_a(K') \subseteq K'$  für alle  $a \in G$ , aber das bedeutet  $K' \triangleleft G$ . □

Wir haben also  $G \triangleright G' \triangleright G'' \triangleright \dots \triangleright G^{(k)} \triangleright G^{(k+1)} \triangleright \dots$ .

Wir wollen zeigen, dass  $G$  auflösbar ist  $\Leftrightarrow \exists k \geq 1$  mit  $G^{(k)} = \{1\}$ .

Dafür brauchen wir:

**Lemma**

Sei  $K \triangleleft G$ . Es gilt  $G/K$  ist abelsch  $\Leftrightarrow K \supseteq G'$ . Insbesondere  $G/G'$  ist abelsch und  $G'$  ist die kleinste normale Untergruppe mit dieser Eigenschaft.

**Beweis**

Aus Bemerkung 1 folgt:  $G/K$  ist abelsch  $\Leftrightarrow (G/K)' = \{1\} \Leftrightarrow (gK, hK) = 1$  für alle  $g, h \in G$ .

Aber  $(gK, hK) = (gK)^{-1}(hK)^{-1}gKhK = (g^{-1}h^{-1}gh)K = (g, h)K$ . Also ist  $G/K$  abelsch  $\Leftrightarrow (g, h)K = K$  für alle  $g, h \in G \Leftrightarrow (g, h) \in K$  für alle  $g, h \in G \Leftrightarrow G' \subseteq K$ .

**Bemerkung 3**

Wir erhalten  $G^{(k)}/G^{(k+1)}$  ist abelsch für alle  $k \in \mathbb{N}$ .

**Satz 1**

$G$  ist auflösbar  $\Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}$  mit  $G^{(k)} = 1$ .

**Beweis**

In der nächsten Vorlesung.

**Bemerkung 4**

“ $\Leftarrow$ ” folgt unmittelbar aus Bemerkung 3.

**Bemerkung 5**

Sei  $H \leq G$ . Es folgt  $H^{(l)} \leq G^{(l)}$  für alle  $l \in \mathbb{N}$ .