
Übungsblatt 5 zur Zahlentheorie

Aufgabe 1.

Sei

$$U := \mathbb{Z} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix} + \mathbb{Z} \begin{pmatrix} 2 \\ 10 \\ 16 \\ 12 \end{pmatrix} + \mathbb{Z} \begin{pmatrix} 1 \\ -10 \\ -7 \\ -9 \end{pmatrix} \subseteq \mathbb{Z}^4.$$

und

$$V := \mathbb{Z} \begin{pmatrix} 5 \\ 15 \\ 5 \end{pmatrix} + \mathbb{Z} \begin{pmatrix} 10 \\ 40 \\ 10 \end{pmatrix} + \mathbb{Z} \begin{pmatrix} -10 \\ 80 \\ 20 \end{pmatrix} \subseteq \mathbb{Z}^3.$$

- (a) Finde ein direktes Produkt G von zyklischen Gruppen und einen Gruppenisomorphismus

$$f: \mathbb{Z}^4/U \longrightarrow G.$$

- (b) Finde eine direkte Summe H von einfachen \mathbb{Z} -Moduln und einen \mathbb{Z} -Isomorphismus

$$h: \mathbb{Z}^3/V \longrightarrow H.$$

Aufgabe 2.

Sei

$$A := \begin{pmatrix} X-1 & X^2-1 & 0 \\ X^3-X^2+X-1 & X^4+X^2-2 & X^2-1 \end{pmatrix} \in \mathbb{Q}[X]^{2 \times 3}.$$

- (a) Berechne die Smithsche Normalform von A und gebe entsprechende Übergangsmatrizen an.
(b) Zeige $\mathbb{Q}[X]^2/\text{im}(A) \cong \mathbb{Q}^3$ als \mathbb{Q} -Vektorraum.

Aufgabe 3.

Sei R ein kommutativer Ring und M, N Moduln über R . Dann bildet $\text{Hom}(M, N)$ mit punktweiser Addition und Skalarmultiplikation einen R -Modul.

Aufgabe 4.

Sei R ein Ring und M ein R -Modul.

- (a) Ist $A \in R^{m \times n}$, $B \in R^{n \times r}$ und $X \in M^{r \times s}$, so gilt $(AB)X = A(BX)$.
(b) $R^{r \times r}$ ist ein Ring mit $1 = I_r$.
(c) $M^{r \times s}$ ist ein $R^{r \times r}$ -Modul.

Abgabe bis Montag, den 23. Mai 2011, 10 Uhr in die Briefkästen neben F411.