

---

Übungsblatt 7 zur Zahlentheorie

---

**Aufgabe 1.**

Sind die Ringe

- (a)  $\mathbb{Z}[X]$
- (b)  $\mathbb{Z}[X]/(X^2 + 4)$
- (c)  $\mathbb{Z}[X]/(X^2 - 3X + 2)$

ganz abgeschlossen?

**Aufgabe 2.**

Sei  $R$  ein Dedekindring und seien  $\mathfrak{p}, \mathfrak{q} \neq (0)$  verschiedene Primideale und  $M$  ein zyklischer  $R$ -Modul. Zeige, dass für alle  $n, m \in \mathbb{N}_0$  die Ideale  $\mathfrak{p}^n$  und  $\mathfrak{q}^m$  koprim sind. Folgere daraus, dass es paarweise verschiedene Primideale  $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_r$  und  $e_1, \dots, e_r \in \mathbb{N}$  gibt mit

$$M \cong R/\mathfrak{p}^{e_1} \times \dots \times R/\mathfrak{p}^{e_r}.$$

**Aufgabe 3.**

Sei  $R$  ein Integritätsring. Beweise oder widerlege folgende Behauptungen

- (a) Für je zwei gebrochene Ideale  $I, J$  gilt  $(I : J) \cdot J = I$ .
- (b) Für gebrochenen Ideale  $I, J$  und  $K$  gilt  $((I : J) : K) = (I : JK)$ .
- (c) Für  $J, I_1, \dots, I_r$  gebrochene Ideale gilt

$$\left( \bigcap_{i=1}^r I_i : J \right) = \bigcap_{i=1}^r (I_i : J).$$

- (d) Für  $J, I_1, \dots, I_r$  gebrochene Ideale gilt

$$\left( J : \sum_{i=1}^r I_i \right) = \sum_{i=1}^r (J : I_i).$$