

§2.7 Eliminationsideale und deren Anwendungen

Generalvoraussetzung

In diesem Abschnitt sei stets $C|K$ eine Körpererweiterung und C algebraisch abgeschlossen.

Eliminationsideale

Definition. Sei $I \subseteq K[\underline{X}]$ ein Ideal und $r \in \{0, \dots, n\}$.
Dann heißt das Ideal

$$I_r := I \cap K[X_{r+1}, \dots, X_n]$$

von $K[X_{r+1}, \dots, X_n]$ das **r -te Eliminationsideal** von I .

Geometrische Bedeutung der Eliminationsideale

Satz. Sei $I \subseteq K[\underline{X}]$ ein Ideal, $r \in \{0, \dots, n\}$ und $\pi: \mathbb{A}^n \rightarrow \mathbb{A}^{n-r}$, $(x_1, \dots, x_n) \mapsto (x_{r+1}, \dots, x_n)$. Dann gilt

$$V(I_r) = \overline{\pi(V(I))},$$

Geometrische Bedeutung der Eliminationsideale

Satz. Sei $I \subseteq K[\underline{X}]$ ein Ideal, $r \in \{0, \dots, n\}$ und $\pi: \mathbb{A}^n \rightarrow \mathbb{A}^{n-r}$, $(x_1, \dots, x_n) \mapsto (x_{r+1}, \dots, x_n)$. Dann gilt

$$V(I_r) = \overline{\pi(V(I))},$$

das heißt $V(I_r)$ ist die kleinste K -Untervarietät von \mathbb{A}^{n-r} , die $\pi(V(I))$ umfasst.

Geometrische Bedeutung der Eliminationsideale

Satz. Sei $I \subseteq K[\underline{X}]$ ein Ideal, $r \in \{0, \dots, n\}$ und $\pi: \mathbb{A}^n \rightarrow \mathbb{A}^{n-r}$, $(x_1, \dots, x_n) \mapsto (x_{r+1}, \dots, x_n)$. Dann gilt

$$V(I_r) = \overline{\pi(V(I))},$$

das heißt $V(I_r)$ ist die kleinste K -Untervarietät von \mathbb{A}^{n-r} , die $\pi(V(I))$ umfasst.

Beweis. Es gilt $V(I_r) = V(\sqrt{I_r})$ und $\overline{\pi(V(I))} = V(I(\pi(V(I))))$.

Geometrische Bedeutung der Eliminationsideale

Satz. Sei $I \subseteq K[\underline{X}]$ ein Ideal, $r \in \{0, \dots, n\}$ und $\pi: \mathbb{A}^n \rightarrow \mathbb{A}^{n-r}$, $(x_1, \dots, x_n) \mapsto (x_{r+1}, \dots, x_n)$. Dann gilt

$$V(I_r) = \overline{\pi(V(I))},$$

das heißt $V(I_r)$ ist die kleinste K -Untervarietät von \mathbb{A}^{n-r} , die $\pi(V(I))$ umfasst.

Beweis. Es gilt $V(I_r) = V(\sqrt{I_r})$ und $\overline{\pi(V(I))} = V(I(\pi(V(I))))$. Daher reicht es $\sqrt{I_r} = I(\pi(V(I)))$ zu zeigen.

Geometrische Bedeutung der Eliminationsideale

Satz. Sei $I \subseteq K[\underline{X}]$ ein Ideal, $r \in \{0, \dots, n\}$ und $\pi: \mathbb{A}^n \rightarrow \mathbb{A}^{n-r}$, $(x_1, \dots, x_n) \mapsto (x_{r+1}, \dots, x_n)$. Dann gilt

$$V(I_r) = \overline{\pi(V(I))},$$

das heißt $V(I_r)$ ist die kleinste K -Untervarietät von \mathbb{A}^{n-r} , die $\pi(V(I))$ umfasst.

Beweis. Es gilt $V(I_r) = V(\sqrt{I_r})$ und $\overline{\pi(V(I))} = V(I(\pi(V(I))))$. Daher reicht es $\sqrt{I_r} = I(\pi(V(I)))$ zu zeigen. Aus der Definition von I_r sieht man aber sofort $\sqrt{I_r} = \sqrt{I} \cap K[X_{r+1}, \dots, X_n]$.

Geometrische Bedeutung der Eliminationsideale

Satz. Sei $I \subseteq K[\underline{X}]$ ein Ideal, $r \in \{0, \dots, n\}$ und $\pi: \mathbb{A}^n \rightarrow \mathbb{A}^{n-r}$, $(x_1, \dots, x_n) \mapsto (x_{r+1}, \dots, x_n)$. Dann gilt

$$V(I_r) = \overline{\pi(V(I))},$$

das heißt $V(I_r)$ ist die kleinste K -Untervarietät von \mathbb{A}^{n-r} , die $\pi(V(I))$ umfasst.

Beweis. Es gilt $V(I_r) = V(\sqrt{I_r})$ und $\overline{\pi(V(I))} = V(I(\pi(V(I))))$. Daher reicht es $\sqrt{I_r} = I(\pi(V(I)))$ zu zeigen. Aus der Definition von I_r sieht man aber sofort $\sqrt{I_r} = \sqrt{I} \cap K[X_{r+1}, \dots, X_n]$. Somit ist zu zeigen:

$$\sqrt{I} \cap K[X_{r+1}, \dots, X_n] = I(\pi(V(I))).$$

Geometrische Bedeutung der Eliminationsideale

Satz. Sei $I \subseteq K[\underline{X}]$ ein Ideal, $r \in \{0, \dots, n\}$ und $\pi: \mathbb{A}^n \rightarrow \mathbb{A}^{n-r}$, $(x_1, \dots, x_n) \mapsto (x_{r+1}, \dots, x_n)$. Dann gilt

$$V(I_r) = \overline{\pi(V(I))},$$

das heißt $V(I_r)$ ist die kleinste K -Untervarietät von \mathbb{A}^{n-r} , die $\pi(V(I))$ umfasst.

Beweis. Es gilt $V(I_r) = V(\sqrt{I_r})$ und $\overline{\pi(V(I))} = V(I(\pi(V(I))))$. Daher reicht es $\sqrt{I_r} = I(\pi(V(I)))$ zu zeigen. Aus der Definition von I_r sieht man aber sofort $\sqrt{I_r} = \sqrt{I} \cap K[X_{r+1}, \dots, X_n]$. Somit ist zu zeigen:

$$\sqrt{I} \cap K[X_{r+1}, \dots, X_n] = I(\pi(V(I))).$$

„ \subseteq “ ist trivial: Sei $f \in \sqrt{I} \cap K[X_{r+1}, \dots, X_n]$ und $x \in V(I)$. Zu zeigen: $f(\pi(x)) = 0$.

Geometrische Bedeutung der Eliminationsideale

Satz. Sei $I \subseteq K[\underline{X}]$ ein Ideal, $r \in \{0, \dots, n\}$ und $\pi: \mathbb{A}^n \rightarrow \mathbb{A}^{n-r}$, $(x_1, \dots, x_n) \mapsto (x_{r+1}, \dots, x_n)$. Dann gilt

$$V(I_r) = \overline{\pi(V(I))},$$

das heißt $V(I_r)$ ist die kleinste K -Untervarietät von \mathbb{A}^{n-r} , die $\pi(V(I))$ umfasst.

Beweis. Es gilt $V(I_r) = V(\sqrt{I_r})$ und $\overline{\pi(V(I))} = V(I(\pi(V(I))))$. Daher reicht es $\sqrt{I_r} = I(\pi(V(I)))$ zu zeigen. Aus der Definition von I_r sieht man aber sofort $\sqrt{I_r} = \sqrt{I} \cap K[X_{r+1}, \dots, X_n]$. Somit ist zu zeigen:

$$\sqrt{I} \cap K[X_{r+1}, \dots, X_n] = I(\pi(V(I))).$$

„ \subseteq “ ist trivial: Sei $f \in \sqrt{I} \cap K[X_{r+1}, \dots, X_n]$ und $x \in V(I)$. Zu zeigen: $f(\pi(x)) = 0$. Wegen $V(I) = V(\sqrt{I})$ gilt $f(x) = 0$, wenn man f als Element von $K[\underline{X}]$ auffasst.

Geometrische Bedeutung der Eliminationsideale

Satz. Sei $I \subseteq K[\underline{X}]$ ein Ideal, $r \in \{0, \dots, n\}$ und $\pi: \mathbb{A}^n \rightarrow \mathbb{A}^{n-r}$, $(x_1, \dots, x_n) \mapsto (x_{r+1}, \dots, x_n)$. Dann gilt

$$V(I_r) = \overline{\pi(V(I))},$$

das heißt $V(I_r)$ ist die kleinste K -Untervarietät von \mathbb{A}^{n-r} , die $\pi(V(I))$ umfasst.

Beweis. Es gilt $V(I_r) = V(\sqrt{I_r})$ und $\overline{\pi(V(I))} = V(I(\pi(V(I))))$. Daher reicht es $\sqrt{I_r} = I(\pi(V(I)))$ zu zeigen. Aus der Definition von I_r sieht man aber sofort $\sqrt{I_r} = \sqrt{I} \cap K[X_{r+1}, \dots, X_n]$. Somit ist zu zeigen:

$$\sqrt{I} \cap K[X_{r+1}, \dots, X_n] = I(\pi(V(I))).$$

„ \subseteq “ ist trivial: Sei $f \in \sqrt{I} \cap K[X_{r+1}, \dots, X_n]$ und $x \in V(I)$. Zu zeigen: $f(\pi(x)) = 0$. Wegen $V(I) = V(\sqrt{I})$ gilt $f(x) = 0$, wenn man f als Element von $K[\underline{X}]$ auffasst. Somit

$$f(\pi(x)) = f(x_{r+1}, \dots, x_n) = f(x_1, \dots, x_n) = f(x) = 0.$$

Geometrische Bedeutung der Eliminationsideale

Satz. Sei $I \subseteq K[\underline{X}]$ ein Ideal, $r \in \{0, \dots, n\}$ und $\pi: \mathbb{A}^n \rightarrow \mathbb{A}^{n-r}$, $(x_1, \dots, x_n) \mapsto (x_{r+1}, \dots, x_n)$. Dann gilt

$$V(I_r) = \overline{\pi(V(I))},$$

das heißt $V(I_r)$ ist die kleinste K -Untervarietät von \mathbb{A}^{n-r} , die $\pi(V(I))$ umfasst.

Beweis. Es gilt $V(I_r) = V(\sqrt{I_r})$ und $\overline{\pi(V(I))} = V(I(\pi(V(I))))$. Daher reicht es $\sqrt{I_r} = I(\pi(V(I)))$ zu zeigen. Aus der Definition von I_r sieht man aber sofort $\sqrt{I_r} = \sqrt{I} \cap K[X_{r+1}, \dots, X_n]$. Somit ist zu zeigen:

$$\sqrt{I} \cap K[X_{r+1}, \dots, X_n] = I(\pi(V(I))).$$

„ \subseteq “ ist trivial: Sei $f \in \sqrt{I} \cap K[X_{r+1}, \dots, X_n]$ und $x \in V(I)$. Zu zeigen: $f(\pi(x)) = 0$. Wegen $V(I) = V(\sqrt{I})$ gilt $f(x) = 0$, wenn man f als Element von $K[\underline{X}]$ auffasst. Somit

$$f(\pi(x)) = f(x_{r+1}, \dots, x_n) = f(x_1, \dots, x_n) = f(x) = 0.$$

„ \supseteq “ Sei $f \in I(\pi(V(I)))$. Zu zeigen: $f \in \sqrt{I}$.

Geometrische Bedeutung der Eliminationsideale

Satz. Sei $I \subseteq K[\underline{X}]$ ein Ideal, $r \in \{0, \dots, n\}$ und $\pi: \mathbb{A}^n \rightarrow \mathbb{A}^{n-r}$, $(x_1, \dots, x_n) \mapsto (x_{r+1}, \dots, x_n)$. Dann gilt

$$V(I_r) = \overline{\pi(V(I))},$$

das heißt $V(I_r)$ ist die kleinste K -Untervarietät von \mathbb{A}^{n-r} , die $\pi(V(I))$ umfasst.

Beweis. Es gilt $V(I_r) = V(\sqrt{I_r})$ und $\overline{\pi(V(I))} = V(I(\pi(V(I))))$. Daher reicht es $\sqrt{I_r} = I(\pi(V(I)))$ zu zeigen. Aus der Definition von I_r sieht man aber sofort $\sqrt{I_r} = \sqrt{I} \cap K[X_{r+1}, \dots, X_n]$. Somit ist zu zeigen:

$$\sqrt{I} \cap K[X_{r+1}, \dots, X_n] = I(\pi(V(I))).$$

„ \subseteq “ ist trivial: Sei $f \in \sqrt{I} \cap K[X_{r+1}, \dots, X_n]$ und $x \in V(I)$. Zu zeigen: $f(\pi(x)) = 0$. Wegen $V(I) = V(\sqrt{I})$ gilt $f(x) = 0$, wenn man f als Element von $K[\underline{X}]$ auffasst. Somit

$$f(\pi(x)) = f(x_{r+1}, \dots, x_n) = f(x_1, \dots, x_n) = f(x) = 0.$$

„ \supseteq “ Sei $f \in I(\pi(V(I)))$. Zu zeigen: $f \in \sqrt{I}$. Mit dem Argument von oben gilt $f \in I(V(I))$, wenn man f als Element von $K[\underline{X}]$ auffasst.

Geometrische Bedeutung der Eliminationsideale

Satz. Sei $I \subseteq K[\underline{X}]$ ein Ideal, $r \in \{0, \dots, n\}$ und $\pi: \mathbb{A}^n \rightarrow \mathbb{A}^{n-r}$, $(x_1, \dots, x_n) \mapsto (x_{r+1}, \dots, x_n)$. Dann gilt

$$V(I_r) = \overline{\pi(V(I))},$$

das heißt $V(I_r)$ ist die kleinste K -Untervarietät von \mathbb{A}^{n-r} , die $\pi(V(I))$ umfasst.

Beweis. Es gilt $V(I_r) = V(\sqrt{I_r})$ und $\overline{\pi(V(I))} = V(I(\pi(V(I))))$. Daher reicht es $\sqrt{I_r} = I(\pi(V(I)))$ zu zeigen. Aus der Definition von I_r sieht man aber sofort $\sqrt{I_r} = \sqrt{I} \cap K[X_{r+1}, \dots, X_n]$. Somit ist zu zeigen:

$$\sqrt{I} \cap K[X_{r+1}, \dots, X_n] = I(\pi(V(I))).$$

„ \subseteq “ ist trivial: Sei $f \in \sqrt{I} \cap K[X_{r+1}, \dots, X_n]$ und $x \in V(I)$. Zu zeigen: $f(\pi(x)) = 0$. Wegen $V(I) = V(\sqrt{I})$ gilt $f(x) = 0$, wenn man f als Element von $K[\underline{X}]$ auffasst. Somit

$$f(\pi(x)) = f(x_{r+1}, \dots, x_n) = f(x_1, \dots, x_n) = f(x) = 0.$$

„ \supseteq “ Sei $f \in I(\pi(V(I)))$. Zu zeigen: $f \in \sqrt{I}$. Mit dem Argument von oben gilt $f \in I(V(I))$, wenn man f als Element von $K[\underline{X}]$ auffasst. Nach dem Nullstellensatz gilt aber $I(V(I)) = \sqrt{I}$, also $f \in \sqrt{I}$. □

Berechnung von Eliminationsidealen

Satz. Sei $I \subseteq K[\underline{X}]$ ein Ideal und G eine Gröbnerbasis von I bezüglich der lexikographischen Ordnung \leq_{lex} auf $[\underline{X}]$. Für $r \in \{0, \dots, n\}$ ist $G_r := G \cap K[X_{r+1}, \dots, X_n]$ eine Gröbnerbasis des r -ten Eliminationsideals I_r bezüglich \leq_{lex} .

Berechnung von Eliminationsidealen

Satz. Sei $I \subseteq K[\underline{X}]$ ein Ideal und G eine Gröbnerbasis von I bezüglich der lexikographischen Ordnung \leq_{lex} auf $[\underline{X}]$. Für $r \in \{0, \dots, n\}$ ist $G_r := G \cap K[X_{r+1}, \dots, X_n]$ eine Gröbnerbasis des r -ten Eliminationsideals I_r bezüglich \leq_{lex} .

Beweis.

Sei $r \in \{0, \dots, n\}$ und $p \in I_r$. Zu zeigen ist die Existenz eines $g \in G_r \setminus \{0\}$ mit $\text{LM}(g) \mid \text{LM}(p)$.

Berechnung von Eliminationsidealen

Satz. Sei $I \subseteq K[\underline{X}]$ ein Ideal und G eine Gröbnerbasis von I bezüglich der lexikographischen Ordnung \leq_{lex} auf $[\underline{X}]$. Für $r \in \{0, \dots, n\}$ ist $G_r := G \cap K[X_{r+1}, \dots, X_n]$ eine Gröbnerbasis des r -ten Eliminationsideals I_r bezüglich \leq_{lex} .

Beweis.

Sei $r \in \{0, \dots, n\}$ und $p \in I_r$. Zu zeigen ist die Existenz eines $g \in G_r \setminus \{0\}$ mit $\text{LM}(g) \mid \text{LM}(p)$. Da $p \in I$ und G eine Gröbnerbasis von I ist, gibt es $g \in G \setminus \{0\}$ mit $\text{LM}(g) \mid \text{LM}(p)$.

Berechnung von Eliminationsidealen

Satz. Sei $I \subseteq K[\underline{X}]$ ein Ideal und G eine Gröbnerbasis von I bezüglich der lexikographischen Ordnung \leq_{lex} auf $[\underline{X}]$. Für $r \in \{0, \dots, n\}$ ist $G_r := G \cap K[X_{r+1}, \dots, X_n]$ eine Gröbnerbasis des r -ten Eliminationsideals I_r bezüglich \leq_{lex} .

Beweis.

Sei $r \in \{0, \dots, n\}$ und $p \in I_r$. Zu zeigen ist die Existenz eines $g \in G_r \setminus \{0\}$ mit $\text{LM}(g) \mid \text{LM}(p)$. Da $p \in I$ und G eine Gröbnerbasis von I ist, gibt es $g \in G \setminus \{0\}$ mit $\text{LM}(g) \mid \text{LM}(p)$. Wegen $p \in K[X_{r+1}, \dots, X_n]$ gilt $\text{LM}(p) \in [X_{r+1}, \dots, X_n]$ und daher auch $\text{LM}(g) \in [X_{r+1}, \dots, X_n]$.

Berechnung von Eliminationsidealen

Satz. Sei $I \subseteq K[\underline{X}]$ ein Ideal und G eine Gröbnerbasis von I bezüglich der lexikographischen Ordnung \leq_{lex} auf $[\underline{X}]$. Für $r \in \{0, \dots, n\}$ ist $G_r := G \cap K[X_{r+1}, \dots, X_n]$ eine Gröbnerbasis des r -ten Eliminationsideals I_r bezüglich \leq_{lex} .

Beweis.

Sei $r \in \{0, \dots, n\}$ und $p \in I_r$. Zu zeigen ist die Existenz eines $g \in G_r \setminus \{0\}$ mit $\text{LM}(g) \mid \text{LM}(p)$. Da $p \in I$ und G eine Gröbnerbasis von I ist, gibt es $g \in G \setminus \{0\}$ mit $\text{LM}(g) \mid \text{LM}(p)$. Wegen $p \in K[X_{r+1}, \dots, X_n]$ gilt $\text{LM}(p) \in [X_{r+1}, \dots, X_n]$ und daher auch $\text{LM}(g) \in [X_{r+1}, \dots, X_n]$. Nach Definition von \leq_{lex} folgt daraus $g \in K[X_{r+1}, \dots, X_n]$, also $g \in G_r$.

Berechnung von Eliminationsidealen

Satz. Sei $I \subseteq K[\underline{X}]$ ein Ideal und G eine Gröbnerbasis von I bezüglich der lexikographischen Ordnung \leq_{lex} auf $[\underline{X}]$. Für $r \in \{0, \dots, n\}$ ist $G_r := G \cap K[X_{r+1}, \dots, X_n]$ eine Gröbnerbasis des r -ten Eliminationsideals I_r bezüglich \leq_{lex} .

Beweis.

Sei $r \in \{0, \dots, n\}$ und $p \in I_r$. Zu zeigen ist die Existenz eines $g \in G_r \setminus \{0\}$ mit $\text{LM}(g) \mid \text{LM}(p)$. Da $p \in I$ und G eine Gröbnerbasis von I ist, gibt es $g \in G \setminus \{0\}$ mit $\text{LM}(g) \mid \text{LM}(p)$. Wegen $p \in K[X_{r+1}, \dots, X_n]$ gilt $\text{LM}(p) \in [X_{r+1}, \dots, X_n]$ und daher auch $\text{LM}(g) \in [X_{r+1}, \dots, X_n]$. Nach Definition von \leq_{lex} folgt daraus $g \in K[X_{r+1}, \dots, X_n]$, also $g \in G_r$. □

Bemerkung. Offensichtlich bleibt der Satz richtig, wenn man statt \leq_{lex} eine beliebige Monomordnung \leq auf $[\underline{X}]$ benutzt mit $X_{r+1}^{\alpha_{r+1}} \cdots X_n^{\alpha_n} < X_i$ für alle $r \in \{0, \dots, n\}$ und $i \in \{1, \dots, r\}$.

Satz. Seien $f_1, \dots, f_m, g_1, \dots, g_s \in K[X_1, \dots, X_n]$. Betrachte den K -Algebrenhomomorphismus

$$\varphi: K[Y_1, \dots, Y_m] \rightarrow K[X_1, \dots, X_n]/(g_1, \dots, g_s), \quad p \mapsto \overline{p(f_1, \dots, f_m)}.$$

Satz. Seien $f_1, \dots, f_m, g_1, \dots, g_s \in K[X_1, \dots, X_n]$. Betrachte den K -Algebrenhomomorphismus

$$\varphi: K[Y_1, \dots, Y_m] \rightarrow K[X_1, \dots, X_n]/(g_1, \dots, g_s), \quad p \mapsto \overline{p(f_1, \dots, f_m)}.$$

(a) Der **Kern von φ** ist das Eliminationsideal $J := I \cap K[\underline{Y}]$ von

$$I := (f_1 - Y_1, \dots, f_m - Y_m, g_1, \dots, g_s) \subseteq K[\underline{X}, \underline{Y}].$$

Satz. Seien $f_1, \dots, f_m, g_1, \dots, g_s \in K[X_1, \dots, X_n]$. Betrachte den K -Algebrenhomomorphismus

$$\varphi: K[Y_1, \dots, Y_m] \rightarrow K[X_1, \dots, X_n]/(g_1, \dots, g_s), \quad p \mapsto \overline{p(f_1, \dots, f_m)}.$$

(a) Der Kern von φ ist das Eliminationsideal $J := I \cap K[\underline{Y}]$ von

$$I := (f_1 - Y_1, \dots, f_m - Y_m, g_1, \dots, g_s) \subseteq K[\underline{X}, \underline{Y}].$$

Beweis für (a). Man zeigt leicht (*) $I \cap K[\underline{X}] = (g_1, \dots, g_s)$.

Satz. Seien $f_1, \dots, f_m, g_1, \dots, g_s \in K[X_1, \dots, X_n]$. Betrachte den K -Algebrenhomomorphismus

$$\varphi: K[Y_1, \dots, Y_m] \rightarrow K[X_1, \dots, X_n]/(g_1, \dots, g_s), \quad p \mapsto \overline{p(f_1, \dots, f_m)}.$$

(a) Der Kern von φ ist das Eliminationsideal $J := I \cap K[\underline{Y}]$ von

$$I := (f_1 - Y_1, \dots, f_m - Y_m, g_1, \dots, g_s) \subseteq K[\underline{X}, \underline{Y}].$$

Beweis für (a). Man zeigt leicht (*) $I \cap K[\underline{X}] = (g_1, \dots, g_s)$. Ist $p \in J$, so $p(f_1, \dots, f_m) \equiv_I p(Y_1, \dots, Y_m) = p \equiv_I 0$ und daher $p(f_1, \dots, f_m) \in I \cap K[\underline{X}] \stackrel{(*)}{=} (g_1, \dots, g_s)$, das heißt $\varphi(p) = 0$.

Satz. Seien $f_1, \dots, f_m, g_1, \dots, g_s \in K[X_1, \dots, X_n]$. Betrachte den K -Algebrenhomomorphismus

$$\varphi: K[Y_1, \dots, Y_m] \rightarrow K[X_1, \dots, X_n]/(g_1, \dots, g_s), \quad p \mapsto \overline{p(f_1, \dots, f_m)}.$$

(a) Der Kern von φ ist das Eliminationsideal $J := I \cap K[\underline{Y}]$ von

$$I := (f_1 - Y_1, \dots, f_m - Y_m, g_1, \dots, g_s) \subseteq K[\underline{X}, \underline{Y}].$$

Beweis für (a). Man zeigt leicht (*) $I \cap K[\underline{X}] = (g_1, \dots, g_s)$. Ist $p \in J$, so $p(f_1, \dots, f_m) \equiv_I p(Y_1, \dots, Y_m) = p \equiv_I 0$ und daher $p(f_1, \dots, f_m) \in I \cap K[\underline{X}] \stackrel{(*)}{=} (g_1, \dots, g_s)$, das heißt $\varphi(p) = 0$. Dies zeigt $J \subseteq \ker \varphi$.

Satz. Seien $f_1, \dots, f_m, g_1, \dots, g_s \in K[X_1, \dots, X_n]$. Betrachte den K -Algebrenhomomorphismus

$$\varphi: K[Y_1, \dots, Y_m] \rightarrow K[X_1, \dots, X_n]/(g_1, \dots, g_s), \quad p \mapsto \overline{p(f_1, \dots, f_m)}.$$

(a) Der Kern von φ ist das Eliminationsideal $J := I \cap K[\underline{Y}]$ von

$$I := (f_1 - Y_1, \dots, f_m - Y_m, g_1, \dots, g_s) \subseteq K[\underline{X}, \underline{Y}].$$

Beweis für (a). Man zeigt leicht (*) $I \cap K[\underline{X}] = (g_1, \dots, g_s)$. Ist $p \in J$, so $p(f_1, \dots, f_m) \equiv_I p(Y_1, \dots, Y_m) = p \equiv_I 0$ und daher $p(f_1, \dots, f_m) \in I \cap K[\underline{X}] \stackrel{(*)}{=} (g_1, \dots, g_s)$, das heißt $\varphi(p) = 0$. Dies zeigt $J \subseteq \ker \varphi$. Ist umgekehrt $p \in \ker \varphi$, so $p = p(Y_1, \dots, Y_m) \equiv_I p(f_1, \dots, f_m) \equiv_I 0$ und daher $p \in I \cap K[\underline{Y}] = J$.

Satz. Seien $f_1, \dots, f_m, g_1, \dots, g_s \in K[X_1, \dots, X_n]$. Betrachte den K -Algebrenhomomorphismus

$$\varphi: K[Y_1, \dots, Y_m] \rightarrow K[X_1, \dots, X_n]/(g_1, \dots, g_s), \quad p \mapsto \overline{p(f_1, \dots, f_m)}.$$

(a) Der Kern von φ ist das Eliminationsideal $J := I \cap K[\underline{Y}]$ von

$$I := (f_1 - Y_1, \dots, f_m - Y_m, g_1, \dots, g_s) \subseteq K[\underline{X}, \underline{Y}].$$

Beweis für (a). Man zeigt leicht (*) $I \cap K[\underline{X}] = (g_1, \dots, g_s)$. Ist $p \in J$, so $p(f_1, \dots, f_m) \equiv_I p(Y_1, \dots, Y_m) = p \equiv_I 0$ und daher $p(f_1, \dots, f_m) \in I \cap K[\underline{X}] \stackrel{(*)}{=} (g_1, \dots, g_s)$, das heißt $\varphi(p) = 0$. Dies zeigt $J \subseteq \ker \varphi$. Ist umgekehrt $p \in \ker \varphi$, so $p = p(Y_1, \dots, Y_m) \equiv_I p(f_1, \dots, f_m) \equiv_I 0$ und daher $p \in I \cap K[\underline{Y}] = J$. Dies zeigt $\ker \varphi \subseteq J$. \square

Satz. Seien $f_1, \dots, f_m, g_1, \dots, g_s \in K[X_1, \dots, X_n]$. Betrachte den K -Algebrenhomomorphismus

$$\varphi: K[Y_1, \dots, Y_m] \rightarrow K[X_1, \dots, X_n]/(g_1, \dots, g_s), \quad p \mapsto \overline{p(f_1, \dots, f_m)}.$$

(b) Sei G eine Gröbnerbasis von I bezüglich der lexikographischen Ordnung auf $[\underline{X}, \underline{Y}]$.

Satz. Seien $f_1, \dots, f_m, g_1, \dots, g_s \in K[X_1, \dots, X_n]$. Betrachte den K -Algebrenhomomorphismus

$$\varphi: K[Y_1, \dots, Y_m] \rightarrow K[X_1, \dots, X_n]/(g_1, \dots, g_s), \quad p \mapsto \overline{p(f_1, \dots, f_m)}.$$

- (b) Sei G eine Gröbnerbasis von I bezüglich der lexikographischen Ordnung auf $[\underline{X}, \underline{Y}]$. Dann ist $G \cap K[\underline{Y}]$ eine Gröbnerbasis von J bezüglich der lexikographischen Ordnung auf $[\underline{Y}]$.

Satz. Seien $f_1, \dots, f_m, g_1, \dots, g_s \in K[X_1, \dots, X_n]$. Betrachte den K -Algebrenhomomorphismus

$$\varphi: K[Y_1, \dots, Y_m] \rightarrow K[X_1, \dots, X_n]/(g_1, \dots, g_s), \quad p \mapsto \overline{p(f_1, \dots, f_m)}.$$

- (b) Sei G eine Gröbnerbasis von I bezüglich der lexikographischen Ordnung auf $[\underline{X}, \underline{Y}]$. Dann ist $G \cap K[\underline{Y}]$ eine Gröbnerbasis von J bezüglich der lexikographischen Ordnung auf $[\underline{Y}]$. Sei $q \in K[\underline{X}]$ und $p \in K[\underline{X}, \underline{Y}]$ reduziert modulo G bezüglich \leq_{lex} mit $q \xrightarrow[G]{*} p$.

Satz. Seien $f_1, \dots, f_m, g_1, \dots, g_s \in K[X_1, \dots, X_n]$. Betrachte den K -Algebrenhomomorphismus

$$\varphi: K[Y_1, \dots, Y_m] \rightarrow K[X_1, \dots, X_n]/(g_1, \dots, g_s), \quad p \mapsto \overline{p(f_1, \dots, f_m)}.$$

- (b) Sei G eine Gröbnerbasis von I bezüglich der lexikographischen Ordnung auf $[\underline{X}, \underline{Y}]$. Dann ist $G \cap K[\underline{Y}]$ eine Gröbnerbasis von J bezüglich der lexikographischen Ordnung auf $[\underline{Y}]$. Sei $q \in K[\underline{X}]$ und $p \in K[\underline{X}, \underline{Y}]$ reduziert modulo G bezüglich \leq_{lex} mit $q \xrightarrow[G]{*} p$. Gilt dann $p \in K[\underline{Y}]$, so $\varphi(p) = \bar{q}$, und andernfalls $\varphi^{-1}(\bar{q}) = \emptyset$.

Satz. Seien $f_1, \dots, f_m, g_1, \dots, g_s \in K[X_1, \dots, X_n]$. Betrachte den K -Algebrenhomomorphismus

$$\varphi: K[Y_1, \dots, Y_m] \rightarrow K[X_1, \dots, X_n]/(g_1, \dots, g_s), \quad p \mapsto \overline{p(f_1, \dots, f_m)}.$$

- (b) Sei G eine Gröbnerbasis von I bezüglich der lexikographischen Ordnung auf $[\underline{X}, \underline{Y}]$. Dann ist $G \cap K[\underline{Y}]$ eine Gröbnerbasis von J bezüglich der lexikographischen Ordnung auf $[\underline{Y}]$. Sei $q \in K[\underline{X}]$ und $p \in K[\underline{X}, \underline{Y}]$ reduziert modulo G bezüglich \leq_{lex} mit $q \xrightarrow[G]{*} p$. Gilt dann $p \in K[\underline{Y}]$, so $\varphi(p) = \bar{q}$, und andernfalls $\varphi^{-1}(\bar{q}) = \emptyset$.

Beweis für (b). Der erste Teil der Aussage folgt aus dem letzten Satz.

Satz. Seien $f_1, \dots, f_m, g_1, \dots, g_s \in K[X_1, \dots, X_n]$. Betrachte den K -Algebrenhomomorphismus

$$\varphi: K[Y_1, \dots, Y_m] \rightarrow K[X_1, \dots, X_n]/(g_1, \dots, g_s), \quad p \mapsto \overline{p(f_1, \dots, f_m)}.$$

(b) Sei G eine Gröbnerbasis von I bezüglich der lexikographischen Ordnung auf $[\underline{X}, \underline{Y}]$. Dann ist $G \cap K[\underline{Y}]$ eine Gröbnerbasis von J bezüglich der lexikographischen Ordnung auf $[\underline{Y}]$. Sei $q \in K[\underline{X}]$ und $p \in K[\underline{X}, \underline{Y}]$ reduziert modulo G bezüglich \leq_{lex} mit $q \xrightarrow[G]{*} p$. Gilt dann $p \in K[\underline{Y}]$, so $\varphi(p) = \bar{q}$, und andernfalls $\varphi^{-1}(\bar{q}) = \emptyset$.

Beweis für (b). Der erste Teil der Aussage folgt aus dem letzten Satz. Sei nun $q \in K[\underline{X}]$ und sei $p \in K[\underline{X}, \underline{Y}]$ reduziert modulo G bezüglich \leq_{lex} mit $q \xrightarrow[G]{*} p$.

Satz. Seien $f_1, \dots, f_m, g_1, \dots, g_s \in K[X_1, \dots, X_n]$. Betrachte den K -Algebrenhomomorphismus

$$\varphi: K[Y_1, \dots, Y_m] \rightarrow K[X_1, \dots, X_n]/(g_1, \dots, g_s), \quad p \mapsto \overline{p(f_1, \dots, f_m)}.$$

- (b) Sei G eine Gröbnerbasis von I bezüglich der lexikographischen Ordnung auf $[X, Y]$. Dann ist $G \cap K[Y]$ eine Gröbnerbasis von J bezüglich der lexikographischen Ordnung auf $[Y]$. Sei $q \in K[X]$ und $p \in K[X, Y]$ reduziert modulo G bezüglich \leq_{lex} mit $q \xrightarrow[G]{*} p$. Gilt dann $p \in K[Y]$, so $\varphi(p) = \bar{q}$, und andernfalls $\varphi^{-1}(\bar{q}) = \emptyset$.

Beweis für (b). Der erste Teil der Aussage folgt aus dem letzten Satz. Sei nun $q \in K[X]$ und sei $p \in K[X, Y]$ reduziert modulo G bezüglich \leq_{lex} mit $q \xrightarrow[G]{*} p$. Gilt dann $p \in K[Y]$, so $p(f_1, \dots, f_m) \equiv_I p(Y_1, \dots, Y_m) = p \equiv_I q$ und daher $p(f_1, \dots, f_m) - q \in I \cap K[X] = (g_1, \dots, g_s)$, das heißt $\varphi(p) = \bar{q}$.

Satz. Seien $f_1, \dots, f_m, g_1, \dots, g_s \in K[X_1, \dots, X_n]$. Betrachte den K -Algebrenhomomorphismus

$$\varphi: K[Y_1, \dots, Y_m] \rightarrow K[X_1, \dots, X_n]/(g_1, \dots, g_s), \quad p \mapsto \overline{p(f_1, \dots, f_m)}.$$

- (b) Sei G eine Gröbnerbasis von I bezüglich der lexikographischen Ordnung auf $[\underline{X}, \underline{Y}]$. Dann ist $G \cap K[\underline{Y}]$ eine Gröbnerbasis von J bezüglich der lexikographischen Ordnung auf $[\underline{Y}]$. Sei $q \in K[\underline{X}]$ und $p \in K[\underline{X}, \underline{Y}]$ reduziert modulo G bezüglich \leq_{lex} mit $q \xrightarrow[G]{*} p$. Gilt dann $p \in K[\underline{Y}]$, so $\varphi(p) = \bar{q}$, und andernfalls $\varphi^{-1}(\bar{q}) = \emptyset$.

Beweis für (b). Der erste Teil der Aussage folgt aus dem letzten Satz. Sei nun $q \in K[\underline{X}]$ und sei $p \in K[\underline{X}, \underline{Y}]$ reduziert modulo G bezüglich \leq_{lex} mit $q \xrightarrow[G]{*} p$. Gilt dann $p \in K[\underline{Y}]$, so $p(f_1, \dots, f_m) \equiv_I p(Y_1, \dots, Y_m) = p \equiv_I q$ und daher $p(f_1, \dots, f_m) - q \in I \cap K[\underline{X}] = (g_1, \dots, g_s)$, das heißt $\varphi(p) = \bar{q}$. Gelte schließlich $\varphi^{-1}(\bar{q}) \neq \emptyset$. Zu zeigen ist dann $p \in K[\underline{Y}]$.

Satz. Seien $f_1, \dots, f_m, g_1, \dots, g_s \in K[X_1, \dots, X_n]$. Betrachte den K -Algebrenhomomorphismus

$$\varphi: K[Y_1, \dots, Y_m] \rightarrow K[X_1, \dots, X_n]/(g_1, \dots, g_s), \quad p \mapsto \overline{p(f_1, \dots, f_m)}.$$

(b) Sei G eine Gröbnerbasis von I bezüglich der lexikographischen Ordnung auf $[X, Y]$. Dann ist $G \cap K[Y]$ eine Gröbnerbasis von J bezüglich der lexikographischen Ordnung auf $[Y]$. Sei $q \in K[X]$ und $p \in K[X, Y]$ reduziert modulo G bezüglich \leq_{lex} mit $q \xrightarrow[G]{*} p$. Gilt dann $p \in K[Y]$, so $\varphi(p) = \bar{q}$, und andernfalls $\varphi^{-1}(\bar{q}) = \emptyset$.

Beweis für (b). Der erste Teil der Aussage folgt aus dem letzten Satz. Sei nun $q \in K[X]$ und sei $p \in K[X, Y]$ reduziert modulo G bezüglich \leq_{lex} mit $q \xrightarrow[G]{*} p$. Gilt dann $p \in K[Y]$, so $p(f_1, \dots, f_m) \equiv_I p(Y_1, \dots, Y_m) = p \equiv_I q$ und daher $p(f_1, \dots, f_m) - q \in I \cap K[X] = (g_1, \dots, g_s)$, das heißt $\varphi(p) = \bar{q}$. Gelte schließlich $\varphi^{-1}(\bar{q}) \neq \emptyset$. Zu zeigen ist dann $p \in K[Y]$. Wähle $p_0 \in K[Y]$ mit $\varphi(p_0) = \bar{q}$. Dann $p_0 = p_0(Y_1, \dots, Y_m) \equiv_I p_0(f_1, \dots, f_m) \equiv_I q$ und da $\xrightarrow[G]{*}$ eindeutig reduziert, muss $p_0 \xrightarrow[G]{*} p$ gelten.

Satz. Seien $f_1, \dots, f_m, g_1, \dots, g_s \in K[X_1, \dots, X_n]$. Betrachte den K -Algebrenhomomorphismus

$$\varphi: K[Y_1, \dots, Y_m] \rightarrow K[X_1, \dots, X_n]/(g_1, \dots, g_s), \quad p \mapsto \overline{p(f_1, \dots, f_m)}.$$

(b) Sei G eine Gröbnerbasis von I bezüglich der lexikographischen Ordnung auf $[X, Y]$. Dann ist $G \cap K[Y]$ eine Gröbnerbasis von J bezüglich der lexikographischen Ordnung auf $[Y]$. Sei $q \in K[X]$ und $p \in K[X, Y]$ reduziert modulo G bezüglich \leq_{lex} mit $q \xrightarrow[G]{*} p$. Gilt dann $p \in K[Y]$, so $\varphi(p) = \bar{q}$, und andernfalls $\varphi^{-1}(\bar{q}) = \emptyset$.

Beweis für (b). Der erste Teil der Aussage folgt aus dem letzten Satz. Sei nun $q \in K[X]$ und sei $p \in K[X, Y]$ reduziert modulo G bezüglich \leq_{lex} mit $q \xrightarrow[G]{*} p$. Gilt dann $p \in K[Y]$, so $p(f_1, \dots, f_m) \equiv_I p(Y_1, \dots, Y_m) = p \equiv_I q$ und daher $p(f_1, \dots, f_m) - q \in I \cap K[X] = (g_1, \dots, g_s)$, das heißt $\varphi(p) = \bar{q}$. Gelte schließlich $\varphi^{-1}(\bar{q}) \neq \emptyset$. Zu zeigen ist dann $p \in K[Y]$. Wähle $p_0 \in K[Y]$ mit $\varphi(p_0) = \bar{q}$. Dann $p_0 = p_0(Y_1, \dots, Y_m) \equiv_I p_0(f_1, \dots, f_m) \equiv_I q$ und da $\xrightarrow[G]{*}$ eindeutig reduziert, muss $p_0 \xrightarrow[G]{*} p$ gelten. Nach Wahl der Monomordnung \leq_{lex} kann während dieser Reduktion kein X_i eingeschleppt werden, das heißt $p_0 \xrightarrow[G \cap K[Y]]{*} p$. \square

Satz. Seien $f_1, \dots, f_m, g_1, \dots, g_s \in K[X_1, \dots, X_n]$. Betrachte den K -Algebrenhomomorphismus

$$\varphi: K[Y_1, \dots, Y_m] \rightarrow K[X_1, \dots, X_n]/(g_1, \dots, g_s), \quad p \mapsto \overline{p(f_1, \dots, f_m)}.$$

(c) Der K -Morphismus $\varphi^*: V(g_1, \dots, g_s) \rightarrow \mathbb{A}^m$ ist gegeben durch $\varphi^*(x) = (f_1(x), \dots, f_m(x))$ für $x \in V(g_1, \dots, g_s)$ und der K -Zariskiabschluss seines Bildes ist $V(J)$. \square

Beweis für (c). Für alle $x \in V(g_1, \dots, g_s)$ gilt $\text{ev}_{\varphi^*(x)} = \text{ev}_x \circ \varphi$ und daher

Satz. Seien $f_1, \dots, f_m, g_1, \dots, g_s \in K[X_1, \dots, X_n]$. Betrachte den K -Algebrenhomomorphismus

$$\varphi: K[Y_1, \dots, Y_m] \rightarrow K[X_1, \dots, X_n]/(g_1, \dots, g_s), \quad p \mapsto \overline{p(f_1, \dots, f_m)}.$$

(c) Der K -Morphismus $\varphi^*: V(g_1, \dots, g_s) \rightarrow \mathbb{A}^m$ ist gegeben durch $\varphi^*(x) = (f_1(x), \dots, f_m(x))$ für $x \in V(g_1, \dots, g_s)$ und der K -Zariskiabschluss seines Bildes ist $V(J)$. \square

Beweis für (c). Für alle $x \in V(g_1, \dots, g_s)$ gilt $\text{ev}_{\varphi^*(x)} = \text{ev}_x \circ \varphi$ und daher

$$\varphi^*(x) = (\text{ev}_{\varphi^*(x)}(Y_1), \dots, \text{ev}_{\varphi^*(x)}(Y_m))$$

Satz. Seien $f_1, \dots, f_m, g_1, \dots, g_s \in K[X_1, \dots, X_n]$. Betrachte den K -Algebrenhomomorphismus

$$\varphi: K[Y_1, \dots, Y_m] \rightarrow K[X_1, \dots, X_n]/(g_1, \dots, g_s), \quad p \mapsto \overline{p(f_1, \dots, f_m)}.$$

(c) Der K -Morphismus $\varphi^*: V(g_1, \dots, g_s) \rightarrow \mathbb{A}^m$ ist gegeben durch $\varphi^*(x) = (f_1(x), \dots, f_m(x))$ für $x \in V(g_1, \dots, g_s)$ und der K -Zariskiabschluss seines Bildes ist $V(J)$. \square

Beweis für (c). Für alle $x \in V(g_1, \dots, g_s)$ gilt $\text{ev}_{\varphi^*(x)} = \text{ev}_x \circ \varphi$ und daher

$$\begin{aligned} \varphi^*(x) &= (\text{ev}_{\varphi^*(x)}(Y_1), \dots, \text{ev}_{\varphi^*(x)}(Y_m)) \\ &= (\text{ev}_x(\varphi(Y_1)), \dots, \text{ev}_x(\varphi(Y_m))) \end{aligned}$$

Satz. Seien $f_1, \dots, f_m, g_1, \dots, g_s \in K[X_1, \dots, X_n]$. Betrachte den K -Algebrenhomomorphismus

$$\varphi: K[Y_1, \dots, Y_m] \rightarrow K[X_1, \dots, X_n]/(g_1, \dots, g_s), \quad p \mapsto \overline{p(f_1, \dots, f_m)}.$$

(c) Der K -Morphismus $\varphi^*: V(g_1, \dots, g_s) \rightarrow \mathbb{A}^m$ ist gegeben durch $\varphi^*(x) = (f_1(x), \dots, f_m(x))$ für $x \in V(g_1, \dots, g_s)$ und der K -Zariskiabschluss seines Bildes ist $V(J)$. \square

Beweis für (c). Für alle $x \in V(g_1, \dots, g_s)$ gilt $\text{ev}_{\varphi^*(x)} = \text{ev}_x \circ \varphi$ und daher

$$\begin{aligned} \varphi^*(x) &= (\text{ev}_{\varphi^*(x)}(Y_1), \dots, \text{ev}_{\varphi^*(x)}(Y_m)) \\ &= (\text{ev}_x(\varphi(Y_1)), \dots, \text{ev}_x(\varphi(Y_m))) \\ &= (\text{ev}_x(\overline{f_1}), \dots, \text{ev}_x(\overline{f_m})) \end{aligned}$$

Satz. Seien $f_1, \dots, f_m, g_1, \dots, g_s \in K[X_1, \dots, X_n]$. Betrachte den K -Algebrenhomomorphismus

$$\varphi: K[Y_1, \dots, Y_m] \rightarrow K[X_1, \dots, X_n]/(g_1, \dots, g_s), \quad p \mapsto \overline{p(f_1, \dots, f_m)}.$$

(c) Der K -Morphismus $\varphi^*: V(g_1, \dots, g_s) \rightarrow \mathbb{A}^m$ ist gegeben durch $\varphi^*(x) = (f_1(x), \dots, f_m(x))$ für $x \in V(g_1, \dots, g_s)$ und der K -Zariskiabschluss seines Bildes ist $V(J)$. \square

Beweis für (c). Für alle $x \in V(g_1, \dots, g_s)$ gilt $\text{ev}_{\varphi^*(x)} = \text{ev}_x \circ \varphi$ und daher

$$\begin{aligned} \varphi^*(x) &= (\text{ev}_{\varphi^*(x)}(Y_1), \dots, \text{ev}_{\varphi^*(x)}(Y_m)) \\ &= (\text{ev}_x(\varphi(Y_1)), \dots, \text{ev}_x(\varphi(Y_m))) \\ &= (\text{ev}_x(\overline{f_1}), \dots, \text{ev}_x(\overline{f_m})) \\ &= (f_1(x), \dots, f_m(x)) \end{aligned}$$

Satz. Seien $f_1, \dots, f_m, g_1, \dots, g_s \in K[X_1, \dots, X_n]$. Betrachte den K -Algebrenhomomorphismus

$$\varphi: K[Y_1, \dots, Y_m] \rightarrow K[X_1, \dots, X_n]/(g_1, \dots, g_s), \quad p \mapsto \overline{p(f_1, \dots, f_m)}.$$

(c) Der K -Morphismus $\varphi^*: V(g_1, \dots, g_s) \rightarrow \mathbb{A}^m$ ist gegeben durch $\varphi^*(x) = (f_1(x), \dots, f_m(x))$ für $x \in V(g_1, \dots, g_s)$ und der K -Zariskiabschluss seines Bildes ist $V(J)$. \square

Beweis für (c). Sei $h \in K[\underline{Y}]$. Dann

$$\begin{aligned} h &\in I(\varphi^*(V(g_1, \dots, g_s))) \\ \iff \forall x \in V(g_1, \dots, g_s) : h(\varphi^*(x)) &= 0 \end{aligned}$$

Satz. Seien $f_1, \dots, f_m, g_1, \dots, g_s \in K[X_1, \dots, X_n]$. Betrachte den K -Algebrenhomomorphismus

$$\varphi: K[Y_1, \dots, Y_m] \rightarrow K[X_1, \dots, X_n]/(g_1, \dots, g_s), \quad p \mapsto \overline{p(f_1, \dots, f_m)}.$$

(c) Der K -Morphismus $\varphi^*: V(g_1, \dots, g_s) \rightarrow \mathbb{A}^m$ ist gegeben durch $\varphi^*(x) = (f_1(x), \dots, f_m(x))$ für $x \in V(g_1, \dots, g_s)$ und der K -Zariskiabschluss seines Bildes ist $V(J)$. \square

Beweis für (c). Sei $h \in K[\underline{Y}]$. Dann

$$\begin{aligned} & h \in I(\varphi^*(V(g_1, \dots, g_s))) \\ \iff & \forall x \in V(g_1, \dots, g_s) : h(\varphi^*(x)) = 0 \\ \iff & \forall x \in V(g_1, \dots, g_s) : h(f_1(x), \dots, f_m(x)) = 0 \\ \iff & h(f_1, \dots, f_m) \in I(V(g_1, \dots, g_s)) \\ \iff & h(f_1, \dots, f_m) \in \sqrt{(g_1, \dots, g_s)} \end{aligned}$$

Satz. Seien $f_1, \dots, f_m, g_1, \dots, g_s \in K[X_1, \dots, X_n]$. Betrachte den K -Algebrenhomomorphismus

$$\varphi: K[Y_1, \dots, Y_m] \rightarrow K[X_1, \dots, X_n]/(g_1, \dots, g_s), \quad p \mapsto \overline{p(f_1, \dots, f_m)}.$$

(c) Der K -Morphismus $\varphi^*: V(g_1, \dots, g_s) \rightarrow \mathbb{A}^m$ ist gegeben durch $\varphi^*(x) = (f_1(x), \dots, f_m(x))$ für $x \in V(g_1, \dots, g_s)$ und der K -Zariskiabschluss seines Bildes ist $V(J)$. \square

Beweis für (c). Sei $h \in K[\underline{Y}]$. Dann

$$\begin{aligned} & h \in I(\varphi^*(V(g_1, \dots, g_s))) \\ \iff & \forall x \in V(g_1, \dots, g_s) : h(\varphi^*(x)) = 0 \\ \iff & \forall x \in V(g_1, \dots, g_s) : h(f_1(x), \dots, f_m(x)) = 0 \\ \iff & h(f_1, \dots, f_m) \in I(V(g_1, \dots, g_s)) \\ \iff & h(f_1, \dots, f_m) \in \sqrt{(g_1, \dots, g_s)} \\ \iff & \exists k \in \mathbb{N} : (h(f_1, \dots, f_m))^k \in (g_1, \dots, g_s) \\ \iff & \exists k \in \mathbb{N} : h^k(f_1, \dots, f_m) \in (g_1, \dots, g_s) \\ \iff & \exists k \in \mathbb{N} : \varphi(h^k) = 0 \iff \exists k \in \mathbb{N} : h^k \in \ker \varphi \\ \iff & \exists k \in \mathbb{N} : h^k \in J \iff h \in \sqrt{J}. \end{aligned}$$

Satz. Seien $f_1, \dots, f_m, g_1, \dots, g_s \in K[X_1, \dots, X_n]$. Betrachte den K -Algebrenhomomorphismus

$$\varphi: K[Y_1, \dots, Y_m] \rightarrow K[X_1, \dots, X_n]/(g_1, \dots, g_s), \quad p \mapsto \overline{p(f_1, \dots, f_m)}.$$

(c) Der K -Morphismus $\varphi^*: V(g_1, \dots, g_s) \rightarrow \mathbb{A}^m$ ist gegeben durch $\varphi^*(x) = (f_1(x), \dots, f_m(x))$ für $x \in V(g_1, \dots, g_s)$ und der K -Zariskiabschluss seines Bildes ist $V(J)$. \square

Beweis für (c). Es folgt $\sqrt{J} = I(\varphi^*(V(g_1, \dots, g_s)))$ und daher

$$V(J) = V(\sqrt{J}) = V(I(\varphi^*(V(g_1, \dots, g_s)))) = \overline{\varphi^*(V(g_1, \dots, g_s))}.$$

\square

Satz. Seien $f_1, \dots, f_m, g_1, \dots, g_s \in K[X_1, \dots, X_n]$. Betrachte den K -Algebrenhomomorphismus

$$\varphi: K[Y_1, \dots, Y_m] \rightarrow K[X_1, \dots, X_n]/(g_1, \dots, g_s), \quad p \mapsto \overline{p(f_1, \dots, f_m)}.$$

(c) Der K -Morphismus $\varphi^*: V(g_1, \dots, g_s) \rightarrow \mathbb{A}^m$ ist gegeben durch $\varphi^*(x) = (f_1(x), \dots, f_m(x))$ für $x \in V(g_1, \dots, g_s)$ und der K -Zariskiabschluss seines Bildes ist $V(J)$. \square

Beweis für (c). Es folgt $\sqrt{J} = I(\varphi^*(V(g_1, \dots, g_s)))$ und daher

$$V(J) = V(\sqrt{J}) = V(I(\varphi^*(V(g_1, \dots, g_s)))) = \overline{\varphi^*(V(g_1, \dots, g_s))}.$$

\square

Bemerkung. Man überlegt sich leicht, dass der letzte Satz im Wesentlichen folgende Probleme löst:

- (a) Berechnung des Kerns eines Homomorphismus zwischen zwei affinen K -Algebren.

Bemerkung. Man überlegt sich leicht, dass der letzte Satz im Wesentlichen folgende Probleme löst:

- (a) Berechnung des Kerns eines Homomorphismus zwischen zwei affinen K -Algebren.
- (b) Entscheidung, ob ein Element im Bild eines Homomorphismus zwischen zwei affinen K -Algebren liegt, und gegebenenfalls Berechnung eines Urbilds.

Bemerkung. Man überlegt sich leicht, dass der letzte Satz im Wesentlichen folgende Probleme löst:

- (a) Berechnung des Kerns eines Homomorphismus zwischen zwei affinen K -Algebren.
- (b) Entscheidung, ob ein Element im Bild eines Homomorphismus zwischen zwei affinen K -Algebren liegt, und gegebenenfalls Berechnung eines Urbilds.
- (c) Beschreibung des K -Zariskiabschlusses des Bildes eines K -Morphismus von affinen Varietäten.

Bemerkung. Man überlegt sich leicht, dass der letzte Satz im Wesentlichen folgende Probleme löst:

- (a) Berechnung des Kerns eines Homomorphismus zwischen zwei affinen K -Algebren.
- (b) Entscheidung, ob ein Element im Bild eines Homomorphismus zwischen zwei affinen K -Algebren liegt, und gegebenenfalls Berechnung eines Urbilds.
- (c) Beschreibung des K -Zariskiabschlusses des Bildes eines K -Morphismus von affinen Varietäten.

Beachte nämlich, dass man in (a) und in (b) \mathfrak{A} davon ausgehen kann, dass der K -Algebrenhomomorphismus auf einer Polynomalgebra definiert ist und dass jeder K -Algebrenhomomorphismus $K[\underline{Y}] \rightarrow K[\underline{X}]/(g_1, \dots, g_s)$ von der im Satz gegebenen Form ist (wähle $f_i \in K[\underline{X}]$ mit $\varphi(Y_i) = \overline{f_i}$).

Implizitierung rationaler Parametrisierungen

Satz. Seien $f_1, \dots, f_m, g_1, \dots, g_m \in K[\underline{X}]$, $g := g_1 \cdots g_m$, sei $L|K$ eine Körpererweiterung und L ein unendlicher Körper, der ein Unterkörper von C ist. Betrachte die Abbildung

$$\begin{aligned} \varphi: L^n \setminus V(g) &\rightarrow L^m \\ x &\mapsto \left(\frac{f_1(x)}{g_1(x)}, \dots, \frac{f_m(x)}{g_m(x)} \right) \end{aligned}$$

und das Eliminationsideal $J := I \cap K[Y_1, \dots, Y_m]$ des Ideals

$$I := (g_1 Y_1 - f_1, \dots, g_m Y_m - f_m, gT - 1) \subseteq K[T, \underline{X}, \underline{Y}].$$

Dann ist $V(J) \cap L^m$ der K -Zariskiabschluss des Bildes von φ in L^m .

Implizitierung rationaler Parametrisierungen

Satz. Seien $f_1, \dots, f_m, g_1, \dots, g_m \in K[\underline{X}]$, $g := g_1 \cdots g_m$, sei $L|K$ eine Körpererweiterung und L ein unendlicher Körper, der ein Unterkörper von C ist. Betrachte die Abbildung

$$\begin{aligned} \varphi: L^n \setminus V(g) &\rightarrow L^m \\ x &\mapsto \left(\frac{f_1(x)}{g_1(x)}, \dots, \frac{f_m(x)}{g_m(x)} \right) \end{aligned}$$

und das Eliminationsideal $J := I \cap K[Y_1, \dots, Y_m]$ des Ideals

$$I := (g_1 Y_1 - f_1, \dots, g_m Y_m - f_m, gT - 1) \subseteq K[T, \underline{X}, \underline{Y}].$$

Dann ist $V(J) \cap L^m$ der K -Zariskiabschluss des Bildes von φ in L^m .

Beweis. Betrachte die Projektion

$$\pi: C^{1+n+m} \rightarrow C^m, (t, x, y) \mapsto y \quad (t \in C, x \in C^n, y \in C^m).$$

Dann gilt offensichtlich $\pi(V(I) \cap L^{1+n+m}) = \varphi(L^n \setminus V(g))$. **Wir wissen schon** $V(J) = \overline{\pi(V(I))}$. Falls $L = C$, so sind wir also bereits fertig.

Implizitierung rationaler Parametrisierungen

Satz. Seien $f_1, \dots, f_m, g_1, \dots, g_m \in K[\underline{X}]$, $g := g_1 \cdots g_m$, sei $L|K$ eine Körpererweiterung und L ein unendlicher Körper, der ein Unterkörper von C ist. Betrachte die Abbildung

$$\begin{aligned}\varphi: L^n \setminus V(g) &\rightarrow L^m \\ x &\mapsto \left(\frac{f_1(x)}{g_1(x)}, \dots, \frac{f_m(x)}{g_m(x)} \right)\end{aligned}$$

und das Eliminationsideal $J := I \cap K[Y_1, \dots, Y_m]$ des Ideals

$$I := (g_1 Y_1 - f_1, \dots, g_m Y_m - f_m, gT - 1) \subseteq K[T, \underline{X}, \underline{Y}].$$

Dann ist $V(J) \cap L^m$ der K -Zariskiabschluss des Bildes von φ in L^m .

Beweis. Den allgemeinen Fall führen wir mittels

$$\begin{aligned}\tilde{\varphi}: C^n \setminus V(g) &\rightarrow C^m \\ x &\mapsto \left(\frac{f_1(x)}{g_1(x)}, \dots, \frac{f_m(x)}{g_m(x)} \right)\end{aligned}$$

auf den Fall $L = C$ zurück.

Implizitierung rationaler Parametrisierungen

Satz. Seien $f_1, \dots, f_m, g_1, \dots, g_m \in K[\underline{X}]$, $g := g_1 \cdots g_m$, sei $L|K$ eine Körpererweiterung und L ein unendlicher Körper, der ein Unterkörper von C ist. Betrachte die Abbildung

$$\begin{aligned} \varphi: L^n \setminus V(g) &\rightarrow L^m \\ x &\mapsto \left(\frac{f_1(x)}{g_1(x)}, \dots, \frac{f_m(x)}{g_m(x)} \right) \end{aligned}$$

und das Eliminationsideal $J := I \cap K[Y_1, \dots, Y_m]$ des Ideals

$$I := (g_1 Y_1 - f_1, \dots, g_m Y_m - f_m, gT - 1) \subseteq K[T, \underline{X}, \underline{Y}].$$

Dann ist $V(J) \cap L^m$ der K -Zariskiabschluss des Bildes von φ in L^m .

Beweis. Wir zeigen, dass $\tilde{\varphi}(C^n \setminus V(g))$ im K -Zariskiabschluss von $\varphi(L^n \setminus V(g))$ in $\underline{\mathbb{A}}^n = C^n$ enthalten ist.

Implizitierung rationaler Parametrisierungen

Satz. Seien $f_1, \dots, f_m, g_1, \dots, g_m \in K[\underline{X}]$, $g := g_1 \cdots g_m$, sei $L|K$ eine Körpererweiterung und L ein unendlicher Körper, der ein Unterkörper von C ist. Betrachte die Abbildung

$$\begin{aligned} \varphi: L^n \setminus V(g) &\rightarrow L^m \\ x &\mapsto \left(\frac{f_1(x)}{g_1(x)}, \dots, \frac{f_m(x)}{g_m(x)} \right) \end{aligned}$$

und das Eliminationsideal $J := I \cap K[Y_1, \dots, Y_m]$ des Ideals

$$I := (g_1 Y_1 - f_1, \dots, g_m Y_m - f_m, gT - 1) \subseteq K[T, \underline{X}, \underline{Y}].$$

Dann ist $V(J) \cap L^m$ der K -Zariskiabschluss des Bildes von φ in L^m .

Beweis. Wir zeigen, dass $\tilde{\varphi}(C^n \setminus V(g))$ im K -Zariskiabschluss von $\varphi(L^n \setminus V(g))$ in $\underline{\mathbb{A}}^n = C^n$ enthalten ist. Dann stimmen nämlich die K -Zariskiabschlüsse von $\tilde{\varphi}(C^n \setminus V(g))$ und $\varphi(L^n \setminus V(g))$ in $\underline{\mathbb{A}}^n$ überein, und deren Schnitt mit L^m ist einerseits nach dem schon bewiesenen Fall $L = C$ gleich $V(J) \cap L^m$

Implizitierung rationaler Parametrisierungen

Satz. Seien $f_1, \dots, f_m, g_1, \dots, g_m \in K[\underline{X}]$, $g := g_1 \cdots g_m$, sei $L|K$ eine Körpererweiterung und L ein unendlicher Körper, der ein Unterkörper von C ist. Betrachte die Abbildung

$$\begin{aligned} \varphi: L^n \setminus V(g) &\rightarrow L^m \\ x &\mapsto \left(\frac{f_1(x)}{g_1(x)}, \dots, \frac{f_m(x)}{g_m(x)} \right) \end{aligned}$$

und das Eliminationsideal $J := I \cap K[Y_1, \dots, Y_m]$ des Ideals

$$I := (g_1 Y_1 - f_1, \dots, g_m Y_m - f_m, gT - 1) \subseteq K[T, \underline{X}, \underline{Y}].$$

Dann ist $V(J) \cap L^m$ der K -Zariskiabschluss des Bildes von φ in L^m .

Beweis. Wir zeigen, dass $\tilde{\varphi}(C^n \setminus V(g))$ im K -Zariskiabschluss von $\varphi(L^n \setminus V(g))$ in $\underline{\mathbb{A}}^n = C^n$ enthalten ist. Dann stimmen nämlich die K -Zariskiabschlüsse von $\tilde{\varphi}(C^n \setminus V(g))$ und $\varphi(L^n \setminus V(g))$ in $\underline{\mathbb{A}}^n$ überein, und deren Schnitt mit L^m ist einerseits nach dem schon bewiesenen Fall $L = C$ gleich $V(J) \cap L^m$ und andererseits gleich dem K -Zariskiabschluss von $\varphi(L^n \setminus V(g))$ in L^m .

Implizitierung rationaler Parametrisierungen

Satz. Seien $f_1, \dots, f_m, g_1, \dots, g_m \in K[\underline{X}]$, $g := g_1 \cdots g_m$, sei $L|K$ eine Körpererweiterung und L ein unendlicher Körper, der ein Unterkörper von C ist. Betrachte die Abbildung

$$\begin{aligned} \varphi: L^n \setminus V(g) &\rightarrow L^m \\ x &\mapsto \left(\frac{f_1(x)}{g_1(x)}, \dots, \frac{f_m(x)}{g_m(x)} \right) \end{aligned}$$

und das Eliminationsideal $J := I \cap K[Y_1, \dots, Y_m]$ des Ideals

$$I := (g_1 Y_1 - f_1, \dots, g_m Y_m - f_m, gT - 1) \subseteq K[T, \underline{X}, \underline{Y}].$$

Dann ist $V(J) \cap L^m$ der K -Zariskiabschluss des Bildes von φ in L^m .

Beweis. Sei also $h \in K[\underline{X}]$ mit $h \in I(\varphi(L^n \setminus V(g)))$. Zu zeigen ist $h \in I(\check{\varphi}(C^n \setminus V(g)))$. \square $g \neq 0$.

Implizitierung rationaler Parametrisierungen

Satz. Seien $f_1, \dots, f_m, g_1, \dots, g_m \in K[\underline{X}]$, $g := g_1 \cdots g_m$, sei $L|K$ eine Körpererweiterung und L ein unendlicher Körper, der ein Unterkörper von C ist. Betrachte die Abbildung

$$\begin{aligned} \varphi: L^n \setminus V(g) &\rightarrow L^m \\ x &\mapsto \left(\frac{f_1(x)}{g_1(x)}, \dots, \frac{f_m(x)}{g_m(x)} \right) \end{aligned}$$

und das Eliminationsideal $J := I \cap K[Y_1, \dots, Y_m]$ des Ideals

$$I := (g_1 Y_1 - f_1, \dots, g_m Y_m - f_m, gT - 1) \subseteq K[T, \underline{X}, \underline{Y}].$$

Dann ist $V(J) \cap L^m$ der K -Zariskiabschluss des Bildes von φ in L^m .

Beweis. Sei also $h \in K[\underline{X}]$ mit $h \in I(\varphi(L^n \setminus V(g)))$. Zu zeigen ist $h \in I(\tilde{\varphi}(C^n \setminus V(g)))$. $\exists g \neq 0$. Die rationale Funktion $r := h \left(\frac{f_1}{g_1}, \dots, \frac{f_m}{g_m} \right) \in K(\underline{X})$ verschwindet auf $L^n \setminus V(g)$.

Implizitierung rationaler Parametrisierungen

Satz. Seien $f_1, \dots, f_m, g_1, \dots, g_m \in K[\underline{X}]$, $g := g_1 \cdots g_m$, sei $L|K$ eine Körpererweiterung und L ein unendlicher Körper, der ein Unterkörper von C ist. Betrachte die Abbildung

$$\begin{aligned} \varphi: L^n \setminus V(g) &\rightarrow L^m \\ x &\mapsto \left(\frac{f_1(x)}{g_1(x)}, \dots, \frac{f_m(x)}{g_m(x)} \right) \end{aligned}$$

und das Eliminationsideal $J := I \cap K[Y_1, \dots, Y_m]$ des Ideals

$$I := (g_1 Y_1 - f_1, \dots, g_m Y_m - f_m, gT - 1) \subseteq K[T, \underline{X}, \underline{Y}].$$

Dann ist $V(J) \cap L^m$ der K -Zariskiabschluss des Bildes von φ in L^m .

Beweis. Sei also $h \in K[\underline{X}]$ mit $h \in I(\varphi(L^n \setminus V(g)))$. Zu zeigen ist $h \in I(\tilde{\varphi}(C^n \setminus V(g)))$. $\exists g \neq 0$. Die rationale Funktion $r := h \left(\frac{f_1}{g_1}, \dots, \frac{f_m}{g_m} \right) \in K(\underline{X})$ verschwindet auf $L^n \setminus V(g)$. Wähle $k \in \mathbb{N}$ mit $g^k r \in K[\underline{X}]$. Dann verschwindet auch $g^k r$ auf $L^n \setminus V(g)$ und $g^{k+1} r$ sogar auf L^n .

Implizitierung rationaler Parametrisierungen

Satz. Seien $f_1, \dots, f_m, g_1, \dots, g_m \in K[\underline{X}]$, $g := g_1 \cdots g_m$, sei $L|K$ eine Körpererweiterung und L ein unendlicher Körper, der ein Unterkörper von C ist. Betrachte die Abbildung

$$\begin{aligned} \varphi: L^n \setminus V(g) &\rightarrow L^m \\ x &\mapsto \left(\frac{f_1(x)}{g_1(x)}, \dots, \frac{f_m(x)}{g_m(x)} \right) \end{aligned}$$

und das Eliminationsideal $J := I \cap K[Y_1, \dots, Y_m]$ des Ideals

$$I := (g_1 Y_1 - f_1, \dots, g_m Y_m - f_m, gT - 1) \subseteq K[T, \underline{X}, \underline{Y}].$$

Dann ist $V(J) \cap L^m$ der K -Zariskiabschluss des Bildes von φ in L^m .

Beweis. Sei also $h \in K[\underline{X}]$ mit $h \in I(\varphi(L^n \setminus V(g)))$. Zu zeigen ist $h \in I(\tilde{\varphi}(C^n \setminus V(g)))$. $\exists g \neq 0$. Die rationale Funktion $r := h \left(\frac{f_1}{g_1}, \dots, \frac{f_m}{g_m} \right) \in K(\underline{X})$ verschwindet auf $L^n \setminus V(g)$. Wähle $k \in \mathbb{N}$ mit $g^k r \in K[\underline{X}]$. Dann verschwindet auch $g^k r$ auf $L^n \setminus V(g)$ und $g^{k+1} r$ sogar auf L^n . Wegen $\#L = \infty$ folgt $g^{k+1} r = 0$. Somit $r = 0$ und daher $h \in I(\tilde{\varphi}(C^n \setminus V(g)))$. □

Satz. Seien $m \in \mathbb{N}$ und I_1, \dots, I_m Ideale von $K[\underline{X}]$.

Für das Eliminationsideal $J \cap K[\underline{X}]$ des Ideals

$$J := (\{T_1 + \dots + T_m - 1\} \cup \{T_i g \mid i \in \{1, \dots, m\}, g \in I_i\}) \subseteq K[\underline{T}, \underline{X}]$$

gilt dann

$$J \cap K[\underline{X}] = I_1 \cap \dots \cap I_m.$$

Satz. Seien $m \in \mathbb{N}$ und I_1, \dots, I_m Ideale von $K[\underline{X}]$.

Für das Eliminationsideal $J \cap K[\underline{X}]$ des Ideals

$$J := (\{T_1 + \dots + T_m - 1\} \cup \{T_i g \mid i \in \{1, \dots, m\}, g \in I_i\}) \subseteq K[\underline{T}, \underline{X}]$$

gilt dann

$$J \cap K[\underline{X}] = I_1 \cap \dots \cap I_m.$$

Seien weiter $f_1, \dots, f_m \in K[\underline{X}]$ gegeben und

$$L := (f_1 + I_1) \cap \dots \cap (f_m + I_m) = \{f \in K[\underline{X}] \mid f \equiv_{I_1} f_1, \dots, f \equiv_{I_m} f_m\}.$$

Dann gilt

$$L = f + (I_1 \cap \dots \cap I_m) = f + (J \cap K[\underline{X}])$$

für alle $f \in L$.

Satz. Seien $m \in \mathbb{N}$ und I_1, \dots, I_m Ideale von $K[\underline{X}]$.

Für das Eliminationsideal $J \cap K[\underline{X}]$ des Ideals

$$J := (\{T_1 + \dots + T_m - 1\} \cup \{T_i g \mid i \in \{1, \dots, m\}, g \in I_i\}) \subseteq K[\underline{T}, \underline{X}]$$

gilt dann

$$J \cap K[\underline{X}] = I_1 \cap \dots \cap I_m.$$

Seien weiter $f_1, \dots, f_m \in K[\underline{X}]$ gegeben und

$$L := (f_1 + I_1) \cap \dots \cap (f_m + I_m) = \{f \in K[\underline{X}] \mid f \equiv_{I_1} f_1, \dots, f \equiv_{I_m} f_m\}.$$

Dann gilt

$$L = f + (I_1 \cap \dots \cap I_m) = f + (J \cap K[\underline{X}])$$

für alle $f \in L$. Sei nun ferner G eine Gröbnerbasis von J bezüglich der lexikographischen Ordnung \leq_{lex} auf $[\underline{T}, \underline{X}]$ und $h \in K[\underline{T}, \underline{X}]$ reduziert modulo G mit $T_1 f_1 + \dots + T_m f_m \xrightarrow[G]{*} h$.

Satz. Seien $m \in \mathbb{N}$ und I_1, \dots, I_m Ideale von $K[\underline{X}]$.

Für das Eliminationsideal $J \cap K[\underline{X}]$ des Ideals

$$J := (\{T_1 + \dots + T_m - 1\} \cup \{T_i g \mid i \in \{1, \dots, m\}, g \in I_i\}) \subseteq K[\underline{T}, \underline{X}]$$

gilt dann

$$J \cap K[\underline{X}] = I_1 \cap \dots \cap I_m.$$

Seien weiter $f_1, \dots, f_m \in K[\underline{X}]$ gegeben und

$$L := (f_1 + I_1) \cap \dots \cap (f_m + I_m) = \{f \in K[\underline{X}] \mid f \equiv_{I_1} f_1, \dots, f \equiv_{I_m} f_m\}.$$

Dann gilt

$$L = f + (I_1 \cap \dots \cap I_m) = f + (J \cap K[\underline{X}])$$

für alle $f \in L$. Sei nun ferner G eine Gröbnerbasis von J bezüglich der lexikographischen Ordnung \leq_{lex} auf $[\underline{T}, \underline{X}]$ und $h \in K[\underline{T}, \underline{X}]$ reduziert modulo G mit $T_1 f_1 + \dots + T_m f_m \xrightarrow[G]{*} h$. Dann

$$L \neq \emptyset \iff h \in K[\underline{X}] \iff h \in L.$$

Satz. Seien $m \in \mathbb{N}$ und I_1, \dots, I_m Ideale von $K[\underline{X}]$.

Für das Eliminationsideal $J \cap K[\underline{X}]$ des Ideals

$$J := (\{T_1 + \dots + T_m - 1\} \cup \{T_i g \mid i \in \{1, \dots, m\}, g \in I_i\}) \subseteq K[\underline{T}, \underline{X}]$$

gilt dann

$$J \cap K[\underline{X}] = I_1 \cap \dots \cap I_m.$$

Beweis. Wir zeigen zunächst $J \cap K[\underline{X}] = I_1 \cap \dots \cap I_m$.

Satz. Seien $m \in \mathbb{N}$ und I_1, \dots, I_m Ideale von $K[\underline{X}]$.

Für das Eliminationsideal $J \cap K[\underline{X}]$ des Ideals

$$J := (\{T_1 + \dots + T_m - 1\} \cup \{T_i g \mid i \in \{1, \dots, m\}, g \in I_i\}) \subseteq K[\underline{T}, \underline{X}]$$

gilt dann

$$J \cap K[\underline{X}] = I_1 \cap \dots \cap I_m.$$

Beweis. Wir zeigen zunächst $J \cap K[\underline{X}] = I_1 \cap \dots \cap I_m$.

„ \supseteq “ Sei $g \in I_1 \cap \dots \cap I_m$. Dann $g = 1 \cdot g \equiv_J (T_1 + \dots + T_m)g = T_1g + \dots + T_mg \equiv_J 0$, also $g \in J$.

Satz. Seien $m \in \mathbb{N}$ und I_1, \dots, I_m Ideale von $K[\underline{X}]$.

Für das Eliminationsideal $J \cap K[\underline{X}]$ des Ideals

$$J := (\{T_1 + \dots + T_m - 1\} \cup \{T_i g \mid i \in \{1, \dots, m\}, g \in I_i\}) \subseteq K[\underline{T}, \underline{X}]$$

gilt dann

$$J \cap K[\underline{X}] = I_1 \cap \dots \cap I_m.$$

Beweis. Wir zeigen zunächst $J \cap K[\underline{X}] = I_1 \cap \dots \cap I_m$.

„ \supseteq “ Sei $g \in I_1 \cap \dots \cap I_m$. Dann $g = 1 \cdot g \equiv_J (T_1 + \dots + T_m)g = T_1g + \dots + T_mg \equiv_J 0$, also $g \in J$.

„ \subseteq “ Sei $g \in J \cap K[\underline{X}]$ und $i \in \{1, \dots, m\}$. **Zu zeigen:** $g \in I_i$. Es gibt $h \in K[\underline{X}]$ und $h_1 \in I_1, \dots, h_m \in I_m$ mit

$$g = h(T_1 + \dots + T_m - 1) + \sum_{j=1}^m T_j h_j.$$

Wende den K -Algebrenhomomorphismus $\varphi: K[\underline{T}, \underline{X}] \rightarrow K[\underline{X}]$ mit $\varphi(X_j) = X_j$ für $j \in \{1, \dots, n\}$ und $\varphi(T_j) = \delta_{ij}$ für $j \in \{1, \dots, m\}$ an. Dann $g = \varphi(g) = \varphi(h) \underbrace{\varphi(T_1 + \dots + T_m - 1)}_{=0} + h_i = h_i \in I_i$.

=0

Satz. Seien $m \in \mathbb{N}$ und I_1, \dots, I_m Ideale von $K[\underline{X}]$. Für

$J := (\{T_1 + \dots + T_m - 1\} \cup \{T_i g \mid i \in \{1, \dots, m\}, g \in I_i\}) \subseteq K[\underline{T}, \underline{X}]$

gilt $J \cap K[\underline{X}] = I_1 \cap \dots \cap I_m$.

Satz. Seien $m \in \mathbb{N}$ und I_1, \dots, I_m Ideale von $K[\underline{X}]$. Für
 $J := (\{T_1 + \dots + T_m - 1\} \cup \{T_i g \mid i \in \{1, \dots, m\}, g \in I_i\}) \subseteq K[\underline{T}, \underline{X}]$
gilt $J \cap K[\underline{X}] = I_1 \cap \dots \cap I_m$. Dies haben wir gerade gesehen!

Satz. Seien $m \in \mathbb{N}$ und I_1, \dots, I_m Ideale von $K[\underline{X}]$. Für

$J := (\{T_1 + \dots + T_m - 1\} \cup \{T_i g \mid i \in \{1, \dots, m\}, g \in I_i\}) \subseteq K[\underline{T}, \underline{X}]$

gilt $J \cap K[\underline{X}] = I_1 \cap \dots \cap I_m$. Seien weiter $f_1, \dots, f_m \in K[\underline{X}]$ gegeben und

$L := (f_1 + I_1) \cap \dots \cap (f_m + I_m) = \{f \in K[\underline{X}] \mid f \equiv_{I_1} f_1, \dots, f \equiv_{I_m} f_m\}$.

Dann gilt $L = f + (I_1 \cap \dots \cap I_m) = f + (J \cap K[\underline{X}])$ für alle $f \in L$.

Satz. Seien $m \in \mathbb{N}$ und I_1, \dots, I_m Ideale von $K[\underline{X}]$. Für

$J := (\{T_1 + \dots + T_m - 1\} \cup \{T_i g \mid i \in \{1, \dots, m\}, g \in I_i\}) \subseteq K[\underline{T}, \underline{X}]$

gilt $J \cap K[\underline{X}] = I_1 \cap \dots \cap I_m$. Seien weiter $f_1, \dots, f_m \in K[\underline{X}]$ gegeben und

$L := (f_1 + I_1) \cap \dots \cap (f_m + I_m) = \{f \in K[\underline{X}] \mid f \equiv_{I_1} f_1, \dots, f \equiv_{I_m} f_m\}$.

Dann gilt $L = f + (I_1 \cap \dots \cap I_m) = f + (J \cap K[\underline{X}])$ für alle $f \in L$. Dies

sieht man sofort!

Satz. Seien $m \in \mathbb{N}$ und I_1, \dots, I_m Ideale von $K[\underline{X}]$. Für

$J := (\{T_1 + \dots + T_m - 1\} \cup \{T_i g \mid i \in \{1, \dots, m\}, g \in I_i\}) \subseteq K[\underline{T}, \underline{X}]$

gilt $J \cap K[\underline{X}] = I_1 \cap \dots \cap I_m$. Seien weiter $f_1, \dots, f_m \in K[\underline{X}]$ gegeben und

$L := (f_1 + I_1) \cap \dots \cap (f_m + I_m) = \{f \in K[\underline{X}] \mid f \equiv_{I_1} f_1, \dots, f \equiv_{I_m} f_m\}$.

Dann gilt $L = f + (I_1 \cap \dots \cap I_m) = f + (J \cap K[\underline{X}])$ für alle $f \in L$. Sei

nun ferner G eine Gröbnerbasis von J bezüglich der lexikographischen

Ordnung \leq_{lex} auf $[\underline{T}, \underline{X}]$ und $h \in K[\underline{T}, \underline{X}]$ reduziert modulo G mit

$T_1 f_1 + \dots + T_m f_m \xrightarrow[G]{*} h$. Dann $L \neq \emptyset \iff h \in K[\underline{X}] \iff h \in L$.

Satz. Seien $m \in \mathbb{N}$ und I_1, \dots, I_m Ideale von $K[\underline{X}]$. Für

$J := (\{T_1 + \dots + T_m - 1\} \cup \{T_i g \mid i \in \{1, \dots, m\}, g \in I_i\}) \subseteq K[\underline{T}, \underline{X}]$
gilt $J \cap K[\underline{X}] = I_1 \cap \dots \cap I_m$. Seien weiter $f_1, \dots, f_m \in K[\underline{X}]$ gegeben und
 $L := (f_1 + I_1) \cap \dots \cap (f_m + I_m) = \{f \in K[\underline{X}] \mid f \equiv_{I_1} f_1, \dots, f \equiv_{I_m} f_m\}$.

Dann gilt $L = f + (I_1 \cap \dots \cap I_m) = f + (J \cap K[\underline{X}])$ für alle $f \in L$. Sei
nun ferner G eine Gröbnerbasis von J bezüglich der lexikographischen
Ordnung \leq_{lex} auf $[\underline{T}, \underline{X}]$ und $h \in K[\underline{T}, \underline{X}]$ reduziert modulo G mit
 $T_1 f_1 + \dots + T_m f_m \xrightarrow[G]{*} h$. Dann $L \neq \emptyset \iff h \in K[\underline{X}] \iff h \in L$.

Beweis. Zu zeigen: (a) $L \neq \emptyset \implies h \in K[\underline{X}]$, (b) $h \in K[\underline{X}] \implies h \in L$.

Satz. Seien $m \in \mathbb{N}$ und I_1, \dots, I_m Ideale von $K[\underline{X}]$. Für

$J := (\{T_1 + \dots + T_m - 1\} \cup \{T_i g \mid i \in \{1, \dots, m\}, g \in I_i\}) \subseteq K[\underline{T}, \underline{X}]$

gilt $J \cap K[\underline{X}] = I_1 \cap \dots \cap I_m$. Seien weiter $f_1, \dots, f_m \in K[\underline{X}]$ gegeben und

$L := (f_1 + I_1) \cap \dots \cap (f_m + I_m) = \{f \in K[\underline{X}] \mid f \equiv_{I_1} f_1, \dots, f \equiv_{I_m} f_m\}$.

Dann gilt $L = f + (I_1 \cap \dots \cap I_m) = f + (J \cap K[\underline{X}])$ für alle $f \in L$. Sei

nun ferner G eine Gröbnerbasis von J bezüglich der lexikographischen

Ordnung \leq_{lex} auf $[\underline{T}, \underline{X}]$ und $h \in K[\underline{T}, \underline{X}]$ reduziert modulo G mit

$T_1 f_1 + \dots + T_m f_m \xrightarrow[G]{*} h$. Dann $L \neq \emptyset \iff h \in K[\underline{X}] \iff h \in L$.

Beweis. Zu zeigen: (a) $L \neq \emptyset \implies h \in K[\underline{X}]$, (b) $h \in K[\underline{X}] \implies h \in L$.

Zu (a). Gelte $L \neq \emptyset$. Wähle $p \in L$.

Satz. Seien $m \in \mathbb{N}$ und I_1, \dots, I_m Ideale von $K[\underline{X}]$. Für

$J := (\{T_1 + \dots + T_m - 1\} \cup \{T_i g \mid i \in \{1, \dots, m\}, g \in I_i\}) \subseteq K[\underline{T}, \underline{X}]$

gilt $J \cap K[\underline{X}] = I_1 \cap \dots \cap I_m$. Seien weiter $f_1, \dots, f_m \in K[\underline{X}]$ gegeben und

$L := (f_1 + I_1) \cap \dots \cap (f_m + I_m) = \{f \in K[\underline{X}] \mid f \equiv_{I_1} f_1, \dots, f \equiv_{I_m} f_m\}$.

Dann gilt $L = f + (I_1 \cap \dots \cap I_m) = f + (J \cap K[\underline{X}])$ für alle $f \in L$. Sei

nun ferner G eine Gröbnerbasis von J bezüglich der lexikographischen

Ordnung \leq_{lex} auf $[\underline{T}, \underline{X}]$ und $h \in K[\underline{T}, \underline{X}]$ reduziert modulo G mit

$T_1 f_1 + \dots + T_m f_m \xrightarrow[G]{*} h$. Dann $L \neq \emptyset \iff h \in K[\underline{X}] \iff h \in L$.

Beweis. Zu zeigen: (a) $L \neq \emptyset \implies h \in K[\underline{X}]$, (b) $h \in K[\underline{X}] \implies h \in L$.

Zu (a). Gelte $L \neq \emptyset$. Wähle $p \in L$. Dann

$$p - (T_1 f_1 + \dots + T_m f_m) = \sum_{i=1}^m T_i (p - f_i) + (1 - \sum_{i=1}^m T_i) p \in J.$$

Satz. Seien $m \in \mathbb{N}$ und I_1, \dots, I_m Ideale von $K[\underline{X}]$. Für

$J := (\{T_1 + \dots + T_m - 1\} \cup \{T_i g \mid i \in \{1, \dots, m\}, g \in I_i\}) \subseteq K[\underline{T}, \underline{X}]$

gilt $J \cap K[\underline{X}] = I_1 \cap \dots \cap I_m$. Seien weiter $f_1, \dots, f_m \in K[\underline{X}]$ gegeben und

$L := (f_1 + I_1) \cap \dots \cap (f_m + I_m) = \{f \in K[\underline{X}] \mid f \equiv_{I_1} f_1, \dots, f \equiv_{I_m} f_m\}$.

Dann gilt $L = f + (I_1 \cap \dots \cap I_m) = f + (J \cap K[\underline{X}])$ für alle $f \in L$. Sei

nun ferner G eine Gröbnerbasis von J bezüglich der lexikographischen

Ordnung \leq_{lex} auf $[\underline{T}, \underline{X}]$ und $h \in K[\underline{T}, \underline{X}]$ reduziert modulo G mit

$T_1 f_1 + \dots + T_m f_m \xrightarrow[G]{*} h$. Dann $L \neq \emptyset \iff h \in K[\underline{X}] \iff h \in L$.

Beweis. Zu zeigen: (a) $L \neq \emptyset \implies h \in K[\underline{X}]$, (b) $h \in K[\underline{X}] \implies h \in L$.

Zu (a). Gelte $L \neq \emptyset$. Wähle $p \in L$. Dann

$$p - (T_1 f_1 + \dots + T_m f_m) = \sum_{i=1}^m T_i (p - f_i) + (1 - \sum_{i=1}^m T_i) p \in J.$$

Da somit $p \equiv_J T_1 f_1 + \dots + T_m f_m$ und $\xrightarrow[G]{*}$ eindeutig reduziert, folgt

$$p \xrightarrow[G]{*} h.$$

Satz. Seien $m \in \mathbb{N}$ und I_1, \dots, I_m Ideale von $K[\underline{X}]$. Für

$$J := (\{T_1 + \dots + T_m - 1\} \cup \{T_i g \mid i \in \{1, \dots, m\}, g \in I_i\}) \subseteq K[\underline{T}, \underline{X}]$$

gilt $J \cap K[\underline{X}] = I_1 \cap \dots \cap I_m$. Seien weiter $f_1, \dots, f_m \in K[\underline{X}]$ gegeben und

$$L := (f_1 + I_1) \cap \dots \cap (f_m + I_m) = \{f \in K[\underline{X}] \mid f \equiv_{I_1} f_1, \dots, f \equiv_{I_m} f_m\}.$$

Dann gilt $L = f + (I_1 \cap \dots \cap I_m) = f + (J \cap K[\underline{X}])$ für alle $f \in L$. Sei

nun ferner G eine Gröbnerbasis von J bezüglich der lexikographischen

Ordnung \leq_{lex} auf $[\underline{T}, \underline{X}]$ und $h \in K[\underline{T}, \underline{X}]$ reduziert modulo G mit

$$T_1 f_1 + \dots + T_m f_m \xrightarrow[G]{*} h. \text{ Dann } L \neq \emptyset \iff h \in K[\underline{X}] \iff h \in L.$$

Beweis. Zu zeigen: (a) $L \neq \emptyset \implies h \in K[\underline{X}]$, (b) $h \in K[\underline{X}] \implies h \in L$.

Zu (a). Gelte $L \neq \emptyset$. Wähle $p \in L$. Dann

$$p - (T_1 f_1 + \dots + T_m f_m) = \sum_{i=1}^m T_i (p - f_i) + (1 - \sum_{i=1}^m T_i) p \in J.$$

Da somit $p \equiv_J T_1 f_1 + \dots + T_m f_m$ und $\xrightarrow[G]{*}$ eindeutig reduziert, folgt

$p \xrightarrow[G]{*} h$. Nach Wahl der Monomordnung \leq_{lex} gilt mit $p \in K[\underline{X}]$ dann aber auch $h \in K[\underline{X}]$.

Satz. Seien $m \in \mathbb{N}$ und I_1, \dots, I_m Ideale von $K[\underline{X}]$. Für

$J := (\{T_1 + \dots + T_m - 1\} \cup \{T_i g \mid i \in \{1, \dots, m\}, g \in I_i\}) \subseteq K[\underline{T}, \underline{X}]$
gilt $J \cap K[\underline{X}] = I_1 \cap \dots \cap I_m$. Seien weiter $f_1, \dots, f_m \in K[\underline{X}]$ gegeben und
 $L := (f_1 + I_1) \cap \dots \cap (f_m + I_m) = \{f \in K[\underline{X}] \mid f \equiv_{I_1} f_1, \dots, f \equiv_{I_m} f_m\}$.

Dann gilt $L = f + (I_1 \cap \dots \cap I_m) = f + (J \cap K[\underline{X}])$ für alle $f \in L$. Sei
nun ferner G eine Gröbnerbasis von J bezüglich der lexikographischen
Ordnung \leq_{lex} auf $[\underline{T}, \underline{X}]$ und $h \in K[\underline{T}, \underline{X}]$ reduziert modulo G mit
 $T_1 f_1 + \dots + T_m f_m \xrightarrow[G]{*} h$. Dann $L \neq \emptyset \iff h \in K[\underline{X}] \iff h \in L$.

Beweis. Zu zeigen: (a) $L \neq \emptyset \implies h \in K[\underline{X}]$, (b) $h \in K[\underline{X}] \implies h \in L$.

Zu (b). Gelte $h \in K[\underline{X}]$. Zu zeigen: $h \in L$.

Satz. Seien $m \in \mathbb{N}$ und I_1, \dots, I_m Ideale von $K[\underline{X}]$. Für

$J := (\{T_1 + \dots + T_m - 1\} \cup \{T_i g \mid i \in \{1, \dots, m\}, g \in I_i\}) \subseteq K[\underline{T}, \underline{X}]$

gilt $J \cap K[\underline{X}] = I_1 \cap \dots \cap I_m$. Seien weiter $f_1, \dots, f_m \in K[\underline{X}]$ gegeben und

$L := (f_1 + I_1) \cap \dots \cap (f_m + I_m) = \{f \in K[\underline{X}] \mid f \equiv_{I_1} f_1, \dots, f \equiv_{I_m} f_m\}$.

Dann gilt $L = f + (I_1 \cap \dots \cap I_m) = f + (J \cap K[\underline{X}])$ für alle $f \in L$. Sei

nun ferner G eine Gröbnerbasis von J bezüglich der lexikographischen

Ordnung \leq_{lex} auf $[\underline{T}, \underline{X}]$ und $h \in K[\underline{T}, \underline{X}]$ reduziert modulo G mit

$T_1 f_1 + \dots + T_m f_m \xrightarrow[G]{*} h$. Dann $L \neq \emptyset \iff h \in K[\underline{X}] \iff h \in L$.

Beweis. Zu zeigen: (a) $L \neq \emptyset \implies h \in K[\underline{X}]$, (b) $h \in K[\underline{X}] \implies h \in L$.

Zu (b). Gelte $h \in K[\underline{X}]$. Zu zeigen: $h \in L$.

Sei $i \in \{1, \dots, m\}$. Zu zeigen: $h \equiv_{I_i} f_i$.

Satz. Seien $m \in \mathbb{N}$ und I_1, \dots, I_m Ideale von $K[\underline{X}]$. Für

$J := (\{T_1 + \dots + T_m - 1\} \cup \{T_i g \mid i \in \{1, \dots, m\}, g \in I_i\}) \subseteq K[\underline{T}, \underline{X}]$
gilt $J \cap K[\underline{X}] = I_1 \cap \dots \cap I_m$. Seien weiter $f_1, \dots, f_m \in K[\underline{X}]$ gegeben und
 $L := (f_1 + I_1) \cap \dots \cap (f_m + I_m) = \{f \in K[\underline{X}] \mid f \equiv_{I_1} f_1, \dots, f \equiv_{I_m} f_m\}$.

Dann gilt $L = f + (I_1 \cap \dots \cap I_m) = f + (J \cap K[\underline{X}])$ für alle $f \in L$. Sei
nun ferner G eine Gröbnerbasis von J bezüglich der lexikographischen
Ordnung \leq_{lex} auf $[\underline{T}, \underline{X}]$ und $h \in K[\underline{T}, \underline{X}]$ reduziert modulo G mit
 $T_1 f_1 + \dots + T_m f_m \xrightarrow[G]{*} h$. Dann $L \neq \emptyset \iff h \in K[\underline{X}] \iff h \in L$.

Beweis. Zu zeigen: (a) $L \neq \emptyset \implies h \in K[\underline{X}]$, (b) $h \in K[\underline{X}] \implies h \in L$.

Zu (b). Gelte $h \in K[\underline{X}]$. Zu zeigen: $h \in L$.

Sei $i \in \{1, \dots, m\}$. Zu zeigen: $h \equiv_{I_i} f_i$.

Aus $h - (T_1 f_1 + \dots + T_m f_m) \in J$ folgt wie oben durch Einsetzen
von 1 für T_i und 0 für T_j für $j \neq i$, dass $h - f_i \in I_i$. □